HOLOCENUL – DATE CRONOLOGICE ȘI CLIMATICE

Mihai TOMESCU

"Nous prélevons une poignée de sable dans le paysage infini et nous le baptisons: monde. C'est sur ce monde que nous appliquons le processus de discrimination. Nous divisons le sable en petits tas: l'ici et l'ailleurs, le blanc et le noir – l'hier et l'aujourd'hui."

Robert M. Pirsig
Traité du zen et de
l'entretien des motocyclettes

Holocenul reprezintă ultimul interval, foarte scurt de altfel (circa 11000-12000 de ani), al istoriei geologice a Pământului. Este intervalul cel mai recent, cel mai apropiat de noi și, prin urmare, cel mai ușor de cercetat, pentru că scurgerea timpului a afectat cel mai puțin sedimentele care îi sunt atribuite; din păcate, datorită tinereții sale, Holocenul este totodată și intervalul cel mai neglijat de geologi în România.

Holocenul și clima sa au făcut să curgă multă cerneală de-a lungul timpului. Deși este definit ca perioadă caldă, interglaciară, Holocenul a înregistrat variații ale climei - nu atât de importante ca cele de la tranziția glaciuar-interglaciuar, dar suficient de marcate pentru a lăsa mărturie în diverse medii. Ideea utilizării oscilațiilor climatice ca sistem de referință pentru corelări în Holocen nu este nouă. Încă din 1890 Sernander împarte Holocenul în perioade caracterizate pe baza climei lor. Această idee a generat numeroase discuții. Spre exemplu, Mangerud *et al.*¹ resping practica realizării de corelări pe baza oscilațiilor climatice - în special pentru Holocen -, aducând argumentul că limitele astfel definite nu sunt perfect sincrone. În schimb, Zagwijn² consideră că variațiile climatice constituie cea mai potrivită bază pentru corelații globale în Cuaternar.

Chiar dacă cronologia Holocenului nu se reduce doar la istoria climei, este cert că evoluția climei reprezintă unul dintre puținele procese cu o desfășurare relativ unitară la scară mare pentru această perioadă. Variațiile climei stau la baza evoluției criosferei (calotele glaciare și ghețarii montani) și a evoluției faunei și florei. În plus, oscilațiile climei au influențat - prin intermediul evoluției criosferei - alături de mișcările scoarței terestre, variațiile nivelului mărilor și oceanelor. Pe de altă parte, ele trebuie să fi influențat și evoluția omului și a relațiilor sale cu mediul înconjurător.

Reconstituirea istoriei climei holocene a pus și pune, încă, probleme. Ea se bazează, ca marea majoritate a reconstituirilor ce se operează în geologie, pe principiul uniformitarianismului³, și a

¹ Mangerud J., Anderson S.T., Berglund B.E., Donner J.J. (1974) *Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification*, Boreas 3, 109-127.

² Zagwijn W.H. (1992) *The beginning of the Ice Age in Europe and its major subdivisions*, Quaternary Science Reviews, 11, 583-591.

³ Uniformitarianismul ca principiu metodologic se bazează pe presupunerile că (i) legile naturale sunt constante în spațiu și timp și că (ii) nu trebuie invocate procese ipotetice atunci când situațiile puse în evidență pot fi explicate prin procese observabile în prezent; Ziegler A.M., Hulver M.L., Lottes A.L., Schmachtenberg W.F. (1984) *Uniformitarianism and Palaeoclimates: Inferences from the Distribution of Carbonate Rocks*, in Brenchley P. (ed.) *Fossils and Climate*, John Wiley & Sons, 3-25.

fost abordată pe mai multe căi – pe de o parte prin intermediul metodelor fizico–chimice, iar pe de altă parte prin prisma metodelor biologice, în speță ecologice. Utilizarea unei mari varietăți de metode în cercetările efectuate asupra diverselor medii ce înregistrează oscilațiile climatice holocene, a dus la acumularea în ultimul timp a unui important și complex volum de informații paleoclimatice. Înmulțirea datărilor radiocarbon, ca și posibilitatea de a calibra aceste datări, furnizează un cadru cronologic destul de precis pentru corelarea acestor informații.

Lucrarea de față nu va rezolva problemele evoluției climei holocene, dar își propune să clarifice unele aspecte ale acesteia. Pornind de la ideea că volumul mare de informații și precizia mai mare a datărilor ar trebui să permită o reformulare a cronologiei climatice a Holocenului, ea ia în discuție informațiile oferite de câteva medii ce înregistrează oscilațiile climatice. Scopul analizei este acela de a realiza o cronologie a acestor oscilații.

Înainte de toate, însă, vom aborda problema definirii Holocenului, cadrul general în care sunt cuprinse toate problemele puse în discuție. Ne vom opri, de asemenea, asupra clasificării stratigrafice Blytt-Sernander și asupra zonărilor palinologice, două problematici ce au avut și au, încă, o importanță deosebită pentru cronologia Holocenului.

1. Definiție

ὅλος (întreg, complet) καινός (recent, nou) – aceasta este etimologia termenului *holocen*. El a fost propus în 1869 de către Gervais pentru a desemna depozitele ce conțin, din punct de vedere paleontologic, exclusiv specii cu reprezentanți în viață, și s-au depus în perioada cea mai recentă a Cuaternarului, ce a urmat ultimei glaciațiuni.

Dacă avem în vedere că argumentul paleontologic se referă cu precădere la fauna continentală, ale cărei ocurențe sunt sporadice, reiese că în definirea Holocenului primează latura climatică. În acest sens se poate spune că Holocenul reprezintă o perioadă interglaciară, sau mai bine zis o parte a unui interglaciar. În această accepțiune, el urmează unei perioade de tranziție ce se interpune între perioada glacială și interglaciar, numită *Tardiglacial*⁴; din această cauză mai este desemnat și prin termenul *Postglacial*. După cum se poate observa, această *definire determinată climatic a Holocenului* – perioada ce a urmat ultimei glaciațiuni – implică un grad destul de mare de imprecizie.

De Jong⁵ consideră că din punct de vedere stratigrafic Holocenul ar trebui considerat, la fel ca și celelalte perioade interglaciare, parte a Pleistocenului. Totuși, deși are o durată de numai circa 10.000 de ani, conform recomandării celui de-al VI-lea congres al INQUA (1961) Holocenul este unitate geocronologică de rang egal cu Pleistocenul (cu o durată de 1,6–1,8 milioane de ani) – epocă a perioadei Cuaternare. Într-adevăr, tocmai apropierea de zilele noastre face ca Holocenul să fie atât de valoros ca moment al istoriei geologice a Pământului – el este interglaciarul ce poate fi studiat cel mai amănunțit. Acest fapt nu este deloc neglijabil în condițiile în care procesele ce au stat la baza declanșării glaciațiunilor pleistocene și a succesiunii ciclurilor glaciare nu sunt încă pe deplin cunoscute.

⁴ Tardiglaciul este caracterizat de alternanța unor oscilații calde (Bölling, Alleröd), a căror amplitudine nu a atins însă nivelele din interglaciare, și reci (Dryas I, II ...), care nu au fost însă atât de riguroase ca stadiile glaciare; datorită faptului că oscilațiile reci au fost suficient de ample, Tardiglaciul este considerat parte integrantă a ultimului glaciare, reprezentând astfel ultima parte a Pleistocenului.

⁵ De Jong J.D. (1967) *The Quaternary of the Netherlands*, in Rankama K. (ed.) *The Quaternary*, vol.2, Interscience Publishers, 301-426.

2. Denumire și echivalențe

Unii autori susțin eliminarea denumirii de *Postglaciar* pe baza faptului că în cadrul Holocenului au existat și etape de răcire și înaintare a ghețarilor – ultima dintre acestea, petrecută chiar în mileniul nostru și documentată prin izvoare scrise, este cunoscută sub numele de Mica Epocă Glaciară (Little Ice Age). Nu trebuie uitat, însă, că este normal ca evoluția climei, rezultată al interferenței mai multor procese oscilatorii (fiecare cu amplitudinea și frecvența proprie), să aibă ea însăși un caracter oscilatoriu permanent. În plus, nici una dintre oscilațiile reci holocene nu a atins, nici pe departe, rigoarea perioadelor glaciare. În schimb, până la ora actuală nu există nici un indiciu care să ne îndemne să credem că s-a sfârșit cu glaciațiunile, iar pe de altă parte *Postglaciar* ar putea fi numite fiecare dintre interglaciarele precedente, la fel cum ultimele faze ale glaciarelor precedente pot fi numite fiecare *Tardiglaciar*. Acestea reprezintă într-adevăr argumente în favoarea eliminării ambilor termeni. Oricum, ținând cont de separarea sa ca epocă aparte a Cuaternarului, denumirea de Holocen este cea mai indicată pentru această epocă.

Odată ajunși aici, trebuie să ne oprim puțin asupra diversilor echivalenți cronologici ai Holocenului.

Dacă definiția Holocenului este pur climatică, în domeniul marin sfârșitul ultimului glaciar și Holocenul corespund unei ridicări a nivelului mărilor și oceanelor ca urmare a topirii marilor calote glaciare. În acest sens Rutot și Van den Broeck introduc în 1885 termenul *Flandrian* pentru a defini cele mai noi depozite cuaternare marine de pe litoralul Flandrei. Dubois îl reia în 1921, utilizându-l pentru depozitele ultimei transgresiuni cuaternare de pe litoralul nordic al Franței⁶.

Combătând utilizarea termenilor *Tardiglaciar* și *Postglaciar*, West⁷ utilizează în Insulele Britanice *Weichselianul superior* (de la echivalentul din Nordul Germaniei al glaciului Würm) pentru primul și *Flandrianul* pentru cel de-al doilea. Termenii *Weichselian superior* și *Flandrian* sunt utilizați în locul *Tardiglaciului* și *Holocenului* de numeroși alți autori⁸. După Pomerol⁹, *Flandrianul* – ce marchează o transgresiune cu faună de ape reci în mările nordice – este echivalent cu *Versilianul* – definit de Blanc în 1936 pentru litoralul mediteranean –, ambele începând înainte de finele Pleistocenului.

Bonifay¹⁰, susținând integrarea Holocenului în Pleistocen, propune să fie denumit *Post-Würm*¹¹. Același autor respinge termenii *Flandrian* – pe motiv că așa cum a fost definit de Dubois ar corespunde doar părții terminale a ultimei transgresiuni cuaternare – și *Grimaldian* (termen introdus de Bourcart în 1938 ca echivalent al *Flandrianului*) – datorită faptului că a fost folosit și pentru a defini o cultură în preistorie. El propune în schimb utilizarea *Versilianului*, pe care îl consideră a începe imediat după maximul regresiei würmiene – în acest caz Holocenul ar corespunde *Versilianului mediu*.

⁶ Alimen M.-H. (1967) *The Quaternary of France*, in Rankama K. (ed.) *The Quaternary*, vol.2, Interscience Publishers, 89-238.

⁷ West R.G. (1967) *The Quaternary of the British Isles*, in Rankama K. (ed.) *The Quaternary*, vol.2, Interscience Publishers, 1-87.

⁸ de Jong J.D., Op.dit., Woldstedt P. (1967) *The Quaternary of Germany*, in Rankama K. (ed.) *The Quaternary*, vol.2, Interscience Publishers, 239-300, O'Sullivan P.E. (1974) *Two Flandrian pollen diagrams from the east-central Highlands of Scotland*, Pollen et Spores, 16, 1, 33-57, Lowe J.J. (1978) *Radiocarbon-dated Lateglacial and Early-Flandrian pollen profiles from the Teith Valley, Perthshire, Scotland*, Pollen et Spores, 20, 3, 367-397, Mansikkaniemi H. (1991) *Regional case studies in Southern Finland with reference to glacial rebound and Baltic regression*, in Starkel L., Gregory K.J., Thornes J.B. (eds.), *Temperate palaeohydrology. Fluvial processes in the temperate zone during the last 15,000 years*, John Wiley & Sons, 79-104 și alții.

⁹ Pomerol Ch. (1973) *Stratigraphie et paléogéographie. Ère Cénozoïque (Tertiaire et Quaternaire)*, Doin, Paris.

¹⁰ Bonifay E. (1975) *L'ère quaternaire: définition, limites et subdivisions sur la base de la chronologie méditerranéenne*, Bulletin de la Société géologique de France, 7^e série, t.17, 380-393.

¹¹ Având în vedere că perioada de tranziție dintre glaciul Würm și Holocen este de mult tratată ca etapă aparte a evoluției climatice și extinzând același raționament, ea ar putea fi denumită *Tardi-Würm*, termen pe care îl consider cel mai potrivit întrucât înlătură toate ambiguitățile.

3. Limita inferioară

Ca și definiția Holocenului și tocmai datorită acesteia, limita inferioară a Holocenului suferă de aceeași imprecizie.

Liteanu¹² definește limita Holocen/Pleistocen în domeniul continental astfel: "în zona temperată se află precizată prin trei fenomene sincrone: 1. dispariția Proboscidiienilor, a Rhinoceridelor, a Cervideelor adaptate la clima rece (*Cervus tarandus*) și apariția faunei de Mamifere actuale; 2. dispariția industriei umane paleolitice și apariția industriei umane neolitice; 3. sfârșitul epocelor glaciare.". Dispariția mamiferelor adaptate la clima rece nu a fost însă datată. Mai mult decât atât, în absența unor depozite cu faună terestră de mamifere, limita astfel definită nu poate fi trasată nici pe baza neolitizării, întrucât aceasta reprezintă un fenomen diacronic la scară regională, neputând servi ca reper de corelare. Ajungem astfel, și în cazul trasării limitei inferioare a Holocenului, tot la latura climatică a acesteia – ea ar fi reprezentată așadar de sfârșitul ultimei glaciațiuni (Würm), definire prea imprecisă pentru a fi satisfăcătoare.

Mai discret decât resturile de mamifere dar cvasi-ubivist ca prezență, polenul a fost utilizat pentru punerea în evidență a oscilațiilor climatice. Vegetația suferă însă mai mult decât fauna de o inerție la schimbările impuse de variațiile climatice, împiedicând trasarea unei limite nete – problematica zonărilor polinice va fi abordată pe larg mai jos (5.). Bazându-se pe diferite studii palinologice efectuate în turbării din zona montană a României, POP *et al.*¹³ plasează limita Holocen/Pleistocen între ceea ce ei definesc drept: *episodul plnetelor cu molidișe puține din faza pinului* (ultima fază a Pleistocenului) și *faza pin-molid* (prima fază a Holocenului). Limita astfel definită nu este însă aplicabilă diagramelor polinice din regiunile de câmpie ale țării, și nici diagramelor din alte părți ale continentului, datorită asociațiilor vegetale diferite ce se dezvoltă în regiunile respective.

În mod analog (atât ca principiu cât și ca aplicabilitate), pentru Insulele Britanice West¹⁴ plasează limita Holocen/Pleistocen între zonele III și IV ale zonării polinice stabilite de Godwin în Anglia în 1956; limita marchează începutul răspândirii arborilor termofili și deciduali la sfârșitul ultimei glaciațiuni. La fel procedează Jalut¹⁵ pentru Pirinei și numeroși alți autori pentru diverse regiuni ale Europei. Ei se bazează fie pe zonarea lui Godwin, fie pe cea realizată de Firbas în 1949 pentru Europa Centrală de la Nord de Alpi (limita Holocen/Pleistocen plasată tot între zonele III și IV) – prilej pentru numeroase neclarități și confuzii, întrucât toate acestea reprezintă limite trasate între biozone (înțelese aici într-un sens foarte larg¹⁶) a căror extensie cronologică și spațială este foarte variabilă.

După cum am arătat mai sus, atât Pomerol¹⁷, cât și Bonifay¹⁸, consideră și Flandrianul și Versilianul ca începând înaintea Holocenului, în Pleistocen. Pe de altă parte, Alimen¹⁹ paralelizează Flandrianul inferior (pe care îl consideră echivalent cu Holocenul inferior) cu stratele cu *Ancylus*

¹² Liteanu E. (1953) *Geologia ținutului de câmpie din basinul inferior al Argeșului și a teraselor Dunării*, Studii tehnice și economice, Hidrogeologie, Seria E, Nr.2, Comitetul Geologic, București, 5-78, p.47.

¹³ Pop E., Boșcaiu N., Lupșa V. (1974) *Nouvelle contribution à l'étude de l'histoire de la végétation du Parc National de Retezat (Roumanie)*, Pollen et Spores, 16, 1, 27-32.

¹⁴ West R.G., *Op.cit.*

¹⁵ Jalut G. (1973) *Analyse pollinique de la tourbière de la Moulinasse: versant Nord Oriental des Pyrénées*, Pollen et Spores, 15, 3-4, 471-509.

¹⁶ Întrucât o mare parte a publicului căruia i se adresează lucrarea de față este formată din ne-geologi, am considerat necesară explicarea (în cadrul mai multor note) unor termeni uzuali ai vocabularului geologic. *Biostratigrafia* studiază distribuția stratigrafică a fosilelor în vederea ordonării rocilor în unități definite pe baza conținutului lor de fosile. *Biozona* (numită și *unitate biostratigrafică*) reprezintă un corp de roci definit și recunoscut pe baza conținutului său de fosile; o biozonă există numai acolo unde caracteristicile ei biostratigrafice diagnostice sunt identificate.

¹⁷ Pomerol Ch., *Op.cit.*

¹⁸ Bonifay E., *Op.cit.*

¹⁹ Alimen M.-H., *Op.cit.*

fluviatilis din stratigrafia Holocenului din zona baltică (descrișă de Munthe în 1910). Aceste strate corespund, însă, Borealului din zona Blytt-Sernander, în timp ce Preborealul (prima etapă a Holocenului) corespunde stratelor cu *Yoldia (Portlandia) arctica*²⁰. Tot pentru zona baltică, Mansikkaniemi²¹, care consideră Flandrianul echivalent cu Holocenul, plasează în baza sa (adică în Preboreal) stratele cu *Yoldia arctica*.

Prin datarea ¹⁴C a limitelor Holocen/Pleistocen trasate pe baza diverselor criterii enumerate mai sus și care, evident, nu erau sincrone, imprecizia s-a transferat în domeniul valorilor absolute. Astfel (pentru a da doar câteva exemple), Gross propune în 1958 valoarea de 10200–10300 BP²²; Horowitz²³ plasează limita Holocen /Pleistocen la 11500 BP pe baza datării sedimentelor analizate palinologic dintr-un foraj din lacul Hula (Nordul Israelului); Jalut²⁴ plasează aceeași limită la 10000 BP; într-o perioadă când calibrarea datelor ¹⁴C nu era încă pusă la punct, el merge încă mai departe și transformă direct această datare (prin scăderea a 1950 de ani) în 8000 BC (care ca datare calibrată ar corespunde aproximativ la 8900 cal.BP!). Utilizarea acestui procedeu, incorect din punct de vedere fizic, era de altfel frecventă în perioada de început a datărilor radiocarbon.

Toate aceste căutări au condus la concluzia că datarea limitei Holocen/Pleistocen nu poate fi decât arbitrară, astfel încât s-a convenit că Holocenul a început acum 10000 de ani; în paranteză fie spus, această dată fusese propusă încă din 1969 de către Comisia pentru Holocen a INQUA²⁵, dar ca valoare necalibrată – 10000 BP –, ce corespunde în realitate datei 11200 cal.BP.

De fapt, important este că limita Holocen/Pleistocen corespunde, pentru toți autorii, unei schimbări climatice majore – o încălzire rapidă și importantă a climei. Aceasta se reflectă în creșterea raportului izotopic ¹⁸O/¹⁶O în sedimentele lacustre din Alpi, Jura, Platoul elvețian și în calota glaciară groenlandeză; în aceasta din urmă, variația raportului ¹⁸O/¹⁶O indică pentru începutul Holocenului o creștere a temperaturii medii anuale cu 7°C în mai puțin de 50 de ani. Același raport izotopic scade pe de altă parte în cochiliile foraminiferelor din Marea Norvegiei și Atlanticul de Nord, indicând accelerarea topirii calotelor glaciare; aceasta duce la o ridicare a nivelului mărilor și oceanelor cu circa 28 de metri în jur de 9350 cal.BC (după unii autori) sau 8950 cal.BC (după alți autori). Studiile efectuate pe resturi de coleoptere în Anglia indică o creștere a temperaturii medii anuale de ordinul a 2,8°C pe secol în această perioadă de început. Lacurile glaciare din Jura înregistrează o scădere marcată de nivel, datorată în special maximului atins de insolația estivală la începutul Holocenului²⁶.

Problema limitei inferioare a Holocenului va mai fi abordată în cele ce urmează.

4. Axel Blytt și Rutger Sernander

Deși mult discutată de-a lungul anilor, cea mai veche divizare a Holocenului, datorată norvegianului Axel Blytt și suedezului Rutger Sernander și introdusă către sfârșitul secolului al XIX-lea, este încă cea mai larg utilizată. Termenii Preboreal, Boreal, Atlantic, Subboreal și Subatlantic sunt

²⁰ Chaline J. (1985) *Histoire de l'homme et des climats au Quaternaire*, Doin, Paris.

²¹ Mansikkaniemi H., *Op.cit.*

²² Mullenders W. (1960) *Contribution à l'étude palynologique des tourbières de la Bar (département des Ardennes)*, Pollen et Spores, 2, 1, 43-55.

²³ Horowitz A. (1971) *Climatic and vegetational developments in northeastern Israel during Upper-Pleistocene - Holocene times*, Pollen et Spores, 13, 2, 255-278.

²⁴ Jalut G., *Op.cit.*

²⁵ de Beaulieu J.-L. (1982) *Palynological subdivision of the Holocene in France*, in Mangerud J., Birks H.J.B., Jäger K.-D. (eds.) *Chronostratigraphic subdivision of the Holocene*, Striae, Vol.16, Uppsala, 106-110.

²⁶ Magny M. (1995) *Une histoire du climat, des derniers mamouths au siècle de l'automobile*, Errance, Paris.

astăzi familiari oricărui cercetător ce are tangențe cu Holocenul, de la geologi și până la arheologi. Ei au jucat un rol deosebit de important în cronologia Holocenului; chiar și astăzi, orice nouă cronologie a Holocenului se raportează și la divizarea Blytt–Sernander. Datorită vechimii de peste un secol, detaliile definirii acestei clasificări stratigrafice se pierd în negura timpului. Din acest motiv și în special datorită faptului că aceste detalii sunt deosebit de importante pentru stabilirea utilității sale actuale, am considerat că este util să rezum aici modul de apariție al divizării Blytt–Sernander, așa cum este prezentat de Mangerud *et al.*²⁷. Această prezentare este utilă cu atât mai mult cu cât apariția divizării Blytt–Sernander nu a fost niciodată prezentată exact în literatura românească.

Termenii ce denumesc subdiviziunile Holocenului în schema Blytt–Sernander au fost introduși de către Blytt, în 1876, pentru a defini grupe ecologice de plante din flora actuală a Norvegiei. Singura conotație stratigrafică a acestor termeni deriva din presupunerea lui Blytt că plantele din diverse grupe ecologice au migrat și s-au instalat în teritoriile eliberate odată cu retragerea calotei glaciare scandinave, într-o succesiune deschisă de plantele cu afinități arctice (boreale) și care se termina cu plantele subatlantice. Mai mult decât atât, pe baza afinităților ecologice actuale ale plantelor, Blytt a presupus că plantele boreale și subboreale s-au instalat în perioade cu pronunțate influențe climatice continentale, iar cele atlantice și subatlantice în perioade cu climă oceanică. Pe de altă parte, în 1882 Blytt pune în relație formarea diferitelor strate din succesiunea stratigrafică a turbăriilor norvegiene cu cele două tipuri de climă – oceanică și continentală. Este de subliniat că în aceste lucrări Blytt a utilizat termenii ce dau astăzi numele diviziunilor clasificării stratigrafice numai pentru a defini afinități ecologice ale plantelor, și nu i-a utilizat pentru denumirea unităților stratigrafice.

Această din urmă utilizare a termenilor este prefigurată de Sernander. În 1889 el pune în relație termenii "boreal", "atlantic" etc., cu interpretarea climatică a stratigrafiei turbăriilor, făcută de Blytt, iar în 1890 utilizează termenii lui Blytt pentru a defini perioade caracterizate de diferite tipuri de climă.

Utilizarea termenilor pentru definirea unităților stratigrafice este consacrată de Blytt, care în 1893 adoptă această practică, atribuind denumiri diferitelor strate pe care le descriesese anterior în turbării, și mai ales de Sernander, care în 1894 utilizează termenii lui Blytt pentru a denumi atât strate din turbării, cât și perioadele ce corespund acumulării lor. Lucrarea lui Sernander din 1894²⁸ este în general recunoscută drept cea care consacrează definirea divizării "Blytt–Sernander".

În ceea ce privește termenul "preboreal", el a fost utilizat inițial (de către Erdtman în 1921 și de către Faegri în 1935) pentru a defini la modul general perioada ce a precedat Borealul, pentru ca mia apoi (Faegri, 1940) să-și restrângă înțelesul numai la intervalul dintre Dryasul Recent și Boreal.

Chaline²⁹ prezintă astfel succesiunea clasică pentru Europa occidentală a divizării Blytt–Sernander (la care am adăugat caracteristicile climatice după Pop³⁰):

♦ **Preboreal** – climă rece și uscată; prima diviziune a Holocenului, văzută ca o ameliorare a climei în comparație cu Tardi–Würmul căruia îi urmează, și caracterizată prin extinderea genului *Betula*, urmat de *Corylus*, *Quercus* și *Ulmus*;

²⁷ Mangerud J. *et al.*, *Op.cit.*

²⁸ Sernander R. (1894) *Studier öfver den Gotländska vegetationens utvecklingshistoria*, Akademisk anhandling, Uppsala.

²⁹ Chaline J. (1972) *Le Quaternaire. L'histoire humaine dans son environnement*, Doin, Paris.

³⁰ Pop E. (1933) *Analizele de polen și însemnătatea lor fitogeografică*, Buletinul Societății Regale Române de Geografie, t.52, 90–147.

♦ **Boreal** – climă mai caldă ca în Preboreal și uscată; se extinde *Pinus* și continuă extinderea genului *Corylus*;

♦ **Atlantic** – climă și mai caldă, umedă; considerat a reprezenta optimumul climatic holocen, Atlanticul este caracterizat printr-o mare extindere a pădurilor de *Quercus*, *Ulmus*, *Tilia*;

♦ **Subboreal** – climă mai rece și mai uscată față de Atlantic; *Tilia* și *Quercus* se restrâng, în timp ce *Fagus*, *Abies* și *Picea* se extind;

♦ **Subatlantic** – climă mai rece față de Subboreal, umedă; caracterizat printr-o puternică expansiune a genurilor *Fagus* și *Corylus*.

Această primă divizare a Holocenului a sedus inițial prin eleganța și coerența sa marea majoritate a autorilor. Acest lucru a fost posibil pe de o parte datorită puterii de rezoluție relativ scăzute a metodelor de reconstituire a paleoclimului, care nu permiteau punerea în evidență a oscilațiilor climatice pe termen mai scurt, iar pe de altă parte datorită absenței și mai apoi frecvenței scăzute a datărilor absolute, ce împiedicau corelările.

În timp însă, semnificația lor inițială s-a estompat, fiecare autor atribuindu-le semnificația pe care a crezut-o de cuviință. Problema rezidă în modul de definire a diviziunilor. Așa cum am văzut, ele au fost definite la origine pe de o parte ca biozone (*assemblage zones*³¹ într-un sens foarte larg), dar și ca climatozone³², unități litostratigrafice³³ și cronostratigrafice³⁴ sau geocronologice³⁵. Această definire multivalentă (atât prin vegetația, cât și prin clima, strățele și respectiv intervalele cronologice care le erau atribuite) valabilă în Sudul Scandinaviei unde au fost descrise, conținea germele unei contradicții ce a proliferat odată cu exportarea termenilor pe alte meleaguri. Evident, variațiile cliimei, care cel puțin la scara emisferei boreale au fost unitare, s-au reflectat diferit funcție de latitudine și altitudine. Pe de altă parte, fiecare latitudine și altitudine erau caracterizate de asociații vegetale diferite în cadrul aceleiași perioade climatice. Prin urmare, diviziunile Blytt-Sernander puteau fi utilizate fie ca biozone, fie drept climatozone, fie ca diviziuni geocronologice³⁶. Acest lucru s-a și întâmplat, ducând la imposibilitatea realizării unor corelări coerente la scară mare. În plus, odată cu dezvoltarea metodelor de datare absolută, fiecare autor a atribuit diviziunilor și o semnificație cronologică, ceea ce a avut ca rezultat valori foarte diverse ale datărilor absolute ale limitelor diviziunilor Blytt-Sernander (după cum se poate observa în tabelul 1).

³¹ *Biozona de asociere (assemblage zone)* este un tip particular de biozonă. Ea este definită drept corpul de roci caracterizat printr-o asociație distinctă de minimum trei taxoni fosili, asociație a cărei prezență deosebește din punct de vedere stratigrafic respectivul corp de roci de rocile adiacente.

³² Deși *climatozona* nu este definită în ghidurile stratigrafice (Salvador A. (ed.) (1994) *International stratigraphic guide: a guide to stratigraphic classification, terminology and procedure*, second edition, International Union of Geological Sciences, Geological Society of America; Rey J. (ed.) (1997) *Stratigraphie. Terminologie française*, Bull. Centres Rech. Explor.-Prod. Elf Aquitaine, Mém.19, Pau, France), nefiind recunoscută ca unitate stratigrafică propriu-zisă, termenul *climatozonă* este relativ frecvent utilizat, în special în lucrările de stratigrafie a cuaternarului. Prin analogie cu tipurile consacrate de unități stratigrafice (litozona, blozona, cronozona), *climatozona* desemnează un corp de roci definit și recunoscut pe baza tipului de climă existent în perioada acumulării sale, climă reflectată de litologia și conținutul de fosile al respectivului corp de roci.

³³ *Litostratigrafia* se ocupă cu descrierea și ordonarea rocilor în unități distincte pe baza caracterelor litologice și a relațiilor stratigrafice. *Unitatea litostratigrafică* (numită și *litozonă*) desemnează un corp de roci definit și recunoscut pe baza unor caracteristici litologice distinctive observabile și a relațiilor stratigrafice.

³⁴ *Cronostratigrafia* se ocupă cu stabilirea ordinii cronologice a corpurilor de roci. *Unitatea cronostratigrafică* reprezintă totalitatea rocilor formate într-un anumit interval de timp geologic.

³⁵ *Geocronologia* se ocupă cu datarea rocilor și a evenimentelor geologice din istoria Pământului. *Unitatea geocronologică* reprezintă o unitate de timp geologic (adică determinat prin metode geologice), abstractă.

³⁶ În ceea ce privește corelarea la scară extinsă a unităților litostratigrafice definite în turbăriile scandinave, este clar că aceasta nu avea cum să fie realizabilă, având în vedere caracterul restrâns din punct de vedere spațial al acestui tip de depozite.

Tabelul 1. Datarea limitelor diviziunilor Blytt-Semander după diverși autori (după de Beaulieu, 1982; de Jong, 1967; Lang, 1985; Magny, 1995; Mangerud et al., 1974; Reille, 1990).

Imposibilitatea utilizării *telle quelle* a divizării Blytt–Sernander a ieșit destul de repede la iveală. Faptul că termenii erau însă demult consacrați și utilizați îl face pe Emil Pop să afirme deja în 1933 că “de îndată ce terminologia lui *Blytt–Sernander* nu se mai poate plivi din literatura cuaternarului ea ar putea fi menținută pentru a indica *etape exclusiv cronologice*”³⁷. Din păcate, ideea palinologului român nu a avut ecou în cadrul comunității științifice a momentului, astfel că actualmente este foarte dificil să se obțină o imagine coerentă prin simpla alăturare pe baza distribuției lor în diverse intervale a rezultatelor publicate în imensul număr de lucrări ce utilizează divizarea Holocenului după schema Blytt–Sernander.

Abia prin anii '60 începe să ia amploare utilizarea diviziunilor Blytt–Sernander exclusiv ca unități cronostratigrafice. În 1975, Faegri și Iversen³⁸ arată că semnificația biostratigrafică pe care ele au avut-o inițial s-a pierdut demult și afirmă că folosirea lor ca biozone nu este justificată. În 1974 deja, Mangerud *et al.*³⁹ au propus un sistem de divizare a Holocenului pur cronostratigrafic, independent de biostratigrafie și climatostratigrafie, dar care folosește numele diviziunilor Blytt–Sernander. Astăzi majoritatea autorilor folosesc diviziunile Blytt–Sernander ca unități cronostratigrafice (din păcate însă cu valori cronologice diferite). Sistemul cu cea mai largă utilizare la ora actuală este cel propus de Mangerud *et al.*⁴⁰, care are avantajul că plasează limitele dintre cronozone la valori rotunde – tab.1.

Unitățile cronostratigrafice reprezintă materialul pe baza căruia se fac în primul rând corelările globale. Ele nu pot fi însă stabilite direct prin studierea depozitelor, ci numai indirect, pe baza datărilor absolute. Prin aceasta ele sunt redundante, putând fi înlocuite direct cu date. Se ivește deci întrebarea de ce mai trebuie utilizate denumiri pentru cronozone din moment ce ele sunt clar definite prin date absolute. Denumirile sunt totuși păstrate pentru că au valoare mnemonică și facilitează sintezele și corelările pe scară largă între rezultatele mai multor discipline. Iată deci că ceea ce afirma Emil Pop în 1933 este valabil, cu un sens puțin modificat, și astăzi – “firește, că întrebuintarea aproape exclusivă [...] a schemei lui Blytt–Sernander, oricât am considera-o azi nepotrivită, ne obligă încă multă vreme să ținem seamă de ea și să sincronizăm mereu etapele noi cu acelea ale acestei scheme”⁴¹.

5. Zonările palinologice

5.1. Definire

Chiar de la apariție, palinologia a abordat problematica divizării Holocenului. Turbăriile reprezintă unul dintre mediile cele mai favorabile conservării în cantități mari a polenului și sunt totodată și foarte ușor abordabile în vederea analizelor polinice. Aceasta a făcut ca ele să constituie principalele surse ale informațiilor în perioada de început a analizelor palinologice. Cum majoritatea turbăriilor au vârstă holocenă, informațiile asupra evoluției vegetației holocene au început să se acumuleze încă din deceniul al doilea al secolului nostru, îmbiind numeroși cercetători la interpretări și corelări.

Posibilitatea de a cuantifica conținutul de o anumită natură al unei secvențe stratigrafice duce la tendința de a diviza stratigrafia acesteia pe baza variațiilor respectivului conținut. În

³⁷ Pop E, *Op.cit.*, p.104; sublinierile îi aparțin autorului original.

³⁸ Faegri K., Iversen J. (1975) *Textbook of pollen analysis*, 3rd ed., Munksgaard, Copenhagen.

³⁹ Mangerud J. *et al.*, *Op.cit.*

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Pop E, *Op.cit.*, p.104.

Tabelul 1. Datarea limitelor diviziunilor Blytt-Sernander după diverși autori (după de Beaulieu, 1982; de Jong, 1967; Lang, 1985; Magny, 1995; Mangerud et al., 1974, Reille, 1990).

Imposibilitatea utilizării *telle quelle* a divizării Blytt–Sernander a ieșit destul de repede la iveală. Faptul că termenii erau însă demult consacrați și utilizați îl face pe Emil Pop să afirme deja în 1933 că “de îndată ce terminologia lui *Blytt–Sernander* nu se mai poate plivi din literatura cuaternarului ea ar putea fi menținută pentru a indica *etape exclusiv cronologice*”³⁷. Din păcate, ideea palinologului român nu a avut ecou în cadrul comunității științifice la momentul, astfel că actualmente este foarte dificil să se obțină o imagine coerentă prin simpla alăturare pe baza distribuției lor în diverse intervale a rezultatelor publicate în imensul număr de lucrări ce utilizează divizarea Holocenului după schema Blytt–Sernander.

Abia prin anii '60 începe să ia amploare utilizarea diviziunilor Blytt–Sernander exclusiv ca unități cronostratigrafice. În 1975, Faegri și Iversen³⁸ arată că semnificația biostratigrafică pe care ele au avut-o inițial s-a pierdut demult și afirmă că folosirea lor ca biozone nu este justificată. În 1974 deja, Mangerud *et al.*³⁹ au propus un sistem de divizare a Holocenului pur cronostratigrafic, independent de biostratigrafie și climatostratigrafie, dar care folosește numele diviziunilor Blytt–Sernander. Astăzi majoritatea autorilor folosesc diviziunile Blytt–Sernander ca unități cronostratigrafice (din păcate însă cu valori cronologice diferite). Sistemul cu cea mai largă utilizare la ora actuală este cel propus de Mangerud *et al.*⁴⁰, care are avantajul că plasează limitele dintre cronozone la valori rotunde – tab.1.

Unitățile cronostratigrafice reprezintă materialul pe baza căruia se fac în primul rând corelările globale. Ele nu pot fi însă stabilite direct prin studierea depozitelor, ci numai indirect, pe baza datărilor absolute. Prin aceasta ele sunt redundante, putând fi înlocuite direct cu date. Se ivește deci întrebarea de ce mai trebuie utilizate denumiri pentru cronozone din moment ce ele sunt clar definite prin date absolute. Denumirile sunt totuși păstrate pentru că au valoare mnemonică și facilitează sintezele și corelările pe scară largă între rezultatele mai multor discipline. Iată deci că ceea ce afirma Emil Pop în 1933 este valabil, cu un sens puțin modificat, și astăzi – “firește, că întrebuintarea aproape exclusivă [...] a schemei lui Blytt–Sernander, oricât am considera-o azi nepotrivită, ne obligă încă multă vreme să ținem seamă de ea și să sincronizăm mereu etapele noi cu acelea ale acestei scheme”⁴¹.

5. Zonările palinologice

5.1. Definiție

Chiar de la apariție, palinologia a abordat problematica divizării Holocenului. Turbăriile reprezintă unul dintre mediile cele mai favorabile conservării în cantități mari a polenului și sunt totodată și foarte ușor abordabile în vederea analizelor polinice. Aceasta a făcut ca ele să constituie principalele surse ale informațiilor în perioada de început a analizelor palinologice. Cum majoritatea turbăriilor au vârstă holocenă, informațiile asupra evoluției vegetației holocene au început să se acumuleze încă din deceniul al doilea al secolului nostru, îmbiind numeroși cercetători la interpretări și corelări.

Posibilitatea de a cuantifica conținutul de o anumită natură al unei secvențe stratigrafice duce la tendința de a diviza stratigrafia acesteia pe baza variațiilor respectivului conținut. În

³⁷ Pop E, *Op.cit.*, p.104; sublinierile îi aparțin autorului original.

³⁸ Faegri K., Iversen J. (1975) *Textbook of pollen analysis*, 3rd ed., Munksgaard, Copenhagen.

³⁹ Mangerud J. *et al.*, *Op.cit.*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Pop E, *Op.cit.*, p.104.

majoritatea categoriilor de divizare stratigrafică, termenul (sufixul) comun utilizat pentru a desemna un interval stratigrafic minor este cel de *zonă*. În palinologie informația stratigrafică (biostratigrafică) este cuantificată sub forma diagramelor polinice⁴² care reprezintă succesiuni de spectre polinice. În acest sens, zona polinică (*pollen zone*) este definită de către Faegri și Iversen⁴³ drept o secvență depozitională de spectre polinice care prezintă o compoziție caracteristică comună, pe de o parte prin prezența sau absența anumitor taxoni, iar pe de altă parte prin relațiile cantitative dintre taxonii prezenți. Altfel spus, zona polinică este o secvență dintr-o diagramă, caracterizată prin conținutul său polinic particular. Astfel definite, zonele polinice ar reprezenta biozone – în general *assemblage zones* – deci unități biostratigrafice, numai că cei doi autori consideră că ele sunt numai atribute ale unei diagrame, nedesemnând și corpul de sedimente din care a fost extras polenul pe baza cărui s-a definit biozona.

Birks și Birks⁴⁴ asociază zonei polinice și o semnificație materială, definind-o drept un corp de sedimente cu un conținut consistent și omogen de spori și polen, care diferă de corpurile de sedimente adiacente prin tipul și frecvența sporilor și polenului. Abia astfel definite zonele polinice sunt biozone în adevăratul sens al termenului. Totuși, zonarea se aplică diagramei polinice, obținându-se în primul rând o succesiune de zone *sensu* Faegri & Iversen⁴⁵, pentru ca apoi acestea să fie transpuse pe coloana stratigrafică propriu-zisă obținându-se biozone. Până la urmă, cel puțin la nivelul Holocenului, divizările, interpretările și corelările operează de fapt cu sensul abstract al biozonelor polinice, lăsând la o parte semnificația lor materială.

5.2. Câteva principii

Zonarea unei diagrame polinice reprezintă o modalitate de simplificare a acesteia prin împărțirea în mai multe zone polinice. Zonarea facilitează descrierea diagramei, interpretarea ei, ca și corelările între diagrame. Ea trebuie să se bazeze exclusiv pe stratigrafia polenului, făcând abstracție de eventuale unități de vegetație sau climatice din trecut (deduse), dar și de unitățile lito- și cronostratigrafice⁴⁶.

Faegri și Iversen⁴⁷ dezvoltă pe larg teoria zonării diagramelor polinice. Pentru ca o zonare să fie valabilă pentru o anumită regiune, trebuie ca ea să fie realizată pe o diagramă cât mai apropiată de diagrama ideală, numită *diagramă normală*. Diagrama normală prezintă un minim de influențe locale și este obținută dintr-o serie cât mai omogenă de sedimente. În cazul unui bazin lacustru, ea provine dintr-o succesiune prelevată din mijlocul bazinului, bazin în care influența eroziunii, redeunerii și a altor procese ce deranjează stratigrafia normală, pe de o parte, și a anomaliilor polinice locale date de vegetația litorală, pe de altă parte, să fie minime. Și în cazul turbăriilor anomaliile date de ploaia polinică datorată vegetației locale trebuie să fie minime – dacă se urmărește evoluția vegetației forestiere trebuie ca turbăria să nu fi fost împădurită. Diagrama normală trebuie apoi să fie comparată cu cât mai multe diagrame din regiunea studiată. Zonarea realizată pe diagrama normală reprezintă zonarea de referință pentru regiunea respectivă.

⁴² Pentru ca textul să nu piardă din cursivitate, pentru termenii de diagramă, spectru și zonă am folosit în locul atributului *sporo-polinic(ă)*, subînțeles, atributul *polinic(ă)*.

⁴³ Faegri K., Iversen J., *Op.cit.*

⁴⁴ Birks H.J.B., Birks H.H. (1980) *Quaternary palaeoecology*, Edward Arnold, London.

⁴⁵ Faegri K., Iversen J., *Op.cit.*

⁴⁶ Birks H.J.B., Birks H.H., *Op.cit.*

⁴⁷ Faegri K., Iversen J., *Op.cit.*

Zonarea trebuie să se bazeze pe criterii cât mai clare. Modificările diagramelor pe baza cărora se definesc limitele zonelor trebuie să fie neechivoce, pentru ca limitele să fie cât mai precis definite, și aceasta cu atât mai mult cu cât reprezintă niște limite artificiale, având în vedere că modificările vegetației nu sunt niciodată instantanee. Este preferabil să se stabilească zone mai puține dar clar definite, decât zone mai numeroase și definite vag. Pe de altă parte însă, trebuie avut în vedere că zonarea reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia se abordează diagrama, deci cu cât zonarea este mai amănunțită (fără a se renunța la principiul clarității definiției), cu atât instrumentul va fi mai performant.

5.3. Istoric

Am găsit de cuviință să insist asupra teoriei zonărilor palinologice întrucât ele au reprezentat o etapă importantă în abordarea cronologiei secvențelor holocene.

O primă divizare, bioclimatică, este propusă încă înainte de 1930 de către Köppen care, după cum arată Pop⁴⁸ propune trei "trepte climatice și forestiere [...] a căror succesiune caracterizează în trăsături mari postglaciarul Europei centrale": *clima pinului, clima stejarului și clima fagului*.

În 1930 chiar von Post, părintele palinologiei, propune împărțirea Holocenului în trei perioade bioclimatice deduse pe baza analizelor palinologice – (i) *perioada de apropiere a timpului călduros*, caracterizată prin apariția și expansiunea arborilor cu oarecare pratenții termofile, (ii) *perioada de culminare a timpului călduros*, în care are loc dezvoltarea maximă a arborilor termofili, și (iii) *perioada de descreștere a căldurii*, când răspândirea arborilor termofili se reduce⁴⁹.

Sintetizând rezultatele analizelor sale de până atunci, Pop prezintă în 1933 o zonare palinologică – el împarte diagramele în *faze forestiere* "după specia sau speciile, care au dominat în cursul timpului"⁵⁰. Sunt descrise *faza de trecere pin-molid*, corespunzând Preborealului din divizarea Blytt-Sernander, *faza molidului cu alun și stejaris mixt în munți (a alunului cu stejaris mixt și molid pe dealuri)*, corespunzând Borealului, Atlanticului și unei părți din Subboreal, *faza carpenului (a molidului cu carpen în munți)*, corespunzând aproximativ celei de-a doua jumătăți a Subborealului și *faza fagului*, ce corespunde Subatlanticului.

Toate acestea nu reprezintă însă zonări palinologice propriu-zise, nedefinind practic niște biozone cu limitele lor; ele mai degrabă trasează, în linii foarte largi și foarte vagi, evoluția vegetației și pe baza acesteia a climei holocene. Totuși ele ating, fără însă a-l îndeplini în întregime (datorită semnificației cronologice imprecise și a reprezentativității reduse în spațiu), principalul obiectiv al oricărei biozonări – stabilirea unei cronologii relative care să permită apoi datări relative și corelări. Același lucru se poate spune despre concluziile multor lucrări asupra Holocenului realizate în perioada respectivă.

În 1935–1938 Jessen realizează pe baza diagramelor polinice și a vestigiilor arheologice din Danemarca și vestul Mării Baltice o primă biozonare pe care o paralelizează cu schema Blytt-Sernander. În 1949 Firbas preia zonarea lui Jessen și o adaptează pentru Europa Centrală. El definește zece biozone – pe care le notează cu cifre romane –, primele trei corespunzând Tardi-Würmului, iar restul de șapte Holocenului⁵¹ (tab.2).

⁴⁸ Pop E, *Op.cit.*, p.104.

⁴⁹ Pop E, *Op.cit.*

⁵⁰ *Idem*, p.102.

⁵¹ Lang ține să sublinieze că deși la origine reprezenta o biozonare, în practică zonarea lui Firbas a fost concepută ca una cronostratigrafică fundamentată climatic. Acest lucru este imposibil din moment ce încadrarea unui spectru polinic într-o biozonă nu implică datarea sa (absolută) atâta timp cât biozonele respective nu îi sunt atașate datări absolute (ceea ce la momentul conceperii biozonării de către Firbas nu era încă posibil); Lang G. (1985) *Palynological research in Switzerland 1925-1985. A documentation of investigations concerning the last 15'000 years*, Diss.Bot.87, J.Cramer, Vaduz, 11-82.

	N. PLANCHAIS 1971 <i>Pays de Loire</i>	M.T. MORZADEC 1974 <i>Bretagne</i> L. VISSET 1979 <i>Basse Loire</i>	M.F. HUAUT 1978-1980 <i>Normandie</i>	G. JALUT 1974 <i>Pyrennees</i>	G. LANG & W. TRAUTMAN 1961 <i>Massif Central</i>	S. WEGMULLER 1966 <i>Jura</i> 1971 <i>Alpes</i>	J.L. DE BEAULIEU 1977 <i>Alpes</i>
0 BP					X	X	X
1000	VIII	VIII	VIII	VIII			
2000					IX	IX	IX
3000				?			
4000	VII _b	VIII VII _b		VII _b	VIII	VIII	VIII
5000		VII _b	VII _b		VIII VII	VIII VII	
6000	VII _a				VII	VII	VII
7000		VII _a	VII _a	VII _a	? VI	VI	VI
8000	VI ? V	VI ? V	VI ? V	VI ? V	V	V	V
9000	IV	? IV	IV	IV	IV	IV	IV
10 000							
H. GODWIN 1956				F. FIRBAS 1949			

Tabelul 2. Zonările Firbas și Godwin și limitele zonelor după diverși autori (după de Beaulieu, 1982).

Godwin realizează în 1956 pentru Tardi-Würmul și Holocenul din Insulele Britanice, o biozonare similară celei a lui Firbas (tab.2). Iată, pentru exemplificare, criteriile de trasare a limitelor biozonelor în zonarea Godwin⁵²:

- Zona IV (zonele I–III aparțin, ca și în zonarea lui Firbas, Tardi-Würmului), corespunzând Preborealului din schema Blytt-Sernander – assemblage zone *Betula-Pinus*; limita inferioară trasată la începutul expansiunii genului *Betula*.

- Zona V, corespunzând primei părți a Borealului – assemblage zone *Corylus-Betula-Pinus*; limita inferioară trasată la începutul expansiunii genului *Corylus*.

- Zona VI, corespunzând celei de-a doua părți a Borealului – assemblage zone *Pinus-Corylus*; limita inferioară marcată de o diminuare a prezenței genului *Betula* și de apariția elementelor stejărișului amestecat (*Quercetum mixtum*).

- Zona VII, corespunzând Atlanticului și Subborealului și divizată în două subzone:

- subzona VIIa (Atlantic) – assemblage zone *Alnus-Quercus-Ulmus-Tilia*; limita inferioară trasată la începutul expansiunii genului *Alnus*;

- subzona VIIb (Subboreal) – assemblage zone *Alnus-Quercus*; limita inferioară marcată de declinul genului *Ulmus*.

- Zona VIII, corespunzând Subatlanticului – assemblage zone *Alnus-Betula-Quercus-Fagus*; limita inferioară marcată de diminuarea drastică a genului *Tilia* și de afirmarea genului *Fagus*.

Din păcate, așa cum arată Birks și Birks⁵³, zonele polinice ale acestor zonări de referință realizate după diverse criterii, nu reprezentau biozone propriu-zise. Abia în 1967 Cushing definește zonele polince cuaternare ca unități biostratigrafice, și anume *assemblage zones*. Totuși, zonările Firbas și Godwin, și într-o mai mică măsură cea a lui Jessen și o alta realizată de Overbeck în 1950 în Saxonia inferioară, au constituit zonările de referință la care s-au raportat toate celelalte biozonări realizate pentru Holocen până către începutul anilor '80. Datorită diferențelor dintre succesiunile cortegiilor vegetale ce s-au succedat în regiuni situate la latitudini și altitudini diferite, criteriile de trasare a limitelor definite în zonările de referință nu puteau fi întotdeauna aplicate⁵⁴. În aceste cazuri, autorii defineau alte criterii de trasare a limitelor, deci alte biozone.

Pentru zonarea Firbas, Gaillard⁵⁵ prezintă datele limitelor biozonelor definite de mai mulți autori în Jura, Prealpi și Plateau Suisse. Astfel, limita VI/V dată de intersecția curbelor *Quercetum mixtum* (în creștere) și *Corylus* (în scădere) a fost datată în jur de 7500 BP; aceeași limită, marcată de prima creștere a curbei genului *Fraxinus* a fost datată 8300 BP. Limita VII/VI a fost datată la 6200 BP pe baza expansiunii genului *Fagus* și la 6000 BP pe baza începutului apariției regulate a genului *Abies*.

În cadrul acestei discuții asupra zonărilor palinologice consider că este nimerit să insist ceva mai mult asupra uneia dintre cele mai discutate limite, și anume limita VIIb/VIIa (Godwin) sau VIII/VII (Firbas), ce coincide cu limita Subboreal/Atlantic. În ambele biozonări această limită este

⁵² Așa cum apar citate în Pearson R. (1978) *Climate and evolution*, Academic Press.

⁵³ Birks H.J.B., Birks H.H., *Op.cit.*

⁵⁴ Spre exemplu creșterea curbei genului *Abies* a fost datată în Sudul Germaniei (unde ea marchează limita dintre biozonele VIII și VII ale zonării Firbas) la 4500 BP, în timp ce în Plateau Suisse ea a fost datată la 5300 BP, iar în Jura și mai devreme, la 5500 BP; Gaillard M.-J. (1985) *Late-glacial and holocene environments of some ancient lakes in the Western Swiss Plateau*, Diss.Bot.87, J.Cramer, Vaduz, 273-336.

⁵⁵ Gaillard M.-J., *Op.cit.*

marcată de un puternic declin al genului *Ulmus* în diagramele polinice. Girling și Greig⁵⁶ citează pentru Insulele Britanice datări ale declinului *Ulmus* cuprinse între 3300 și 2900 BP, iar Sturludottir și Turner⁵⁷ citează pentru același eveniment datări efectuate în situri din Nordul Penninilor (Anglia) și cuprinse între 4950 și 4500 BP.

Ten Hove⁵⁸ consideră declinul *Ulmus* un efect conjugat al activităților umane secundate de modificarea climei. Astfel, omul ar fi putut împuțina arborii prin despăduriri în vederea obținerii de terenuri pentru pășunat sau agricultură, iar pe de altă parte ar fi putut să afecteze productivitatea polinică a arborilor practicând tăierea ramurilor lor pentru a folosi frunzele ca nutreț pentru vite. O relativă aridizare a climei, așa cum se considera că s-a întâmplat la tranziția Atlantic-Subboreal, ducând la o coborâre a nivelului freatic, ar fi defavorizat genul *Ulmus* față de *Tilia* sau *Quercus* (de exemplu) datorită faptului că primul are sistemul radicular dezvoltat în special pe orizontală – odată cu încetarea circulației fluidelor prin vasele sistemului radicular, acestea sunt blocate ireversibil prin formarea de țesut calos.

Girling și Greig⁵⁹ pun declinul *Ulmus* tot pe seama activităților umane, numai că ei consideră că numărul oamenilor nu putea fi atât de mare încât să justifice un astfel de declin. Cei doi autori citează pentru prima dată prezența resturilor insectei *Scolytus scolytus* în apropierea orizontului de declin *Ulmus*. *Scolytus scolytus* și *Scolytus multistriatus* sunt astăzi agenți de transport ai ciupercii *Ceratocystis ulmi* ce provoacă gelificarea țesuturilor numită *boala olandeză a ulmului* (*dutch elm disease*) și în final moartea arborilor. Cu toate că nu există dovezi că *Ceratocystis* ar fi agentul patogen care a provocat declinul *Ulmus*, autorii îl consideră un candidat pentru explicarea acestui declin, cu atât mai mult cu cât au fost descoperite resturile agentului său de transport. Boala, a cărei ultimă izbucnire a început să aibă efecte în nord-vestul Europei în 1960, se pare că a avut și izbucniri mai vechi, în secolele XIX și XVI.

Tot în 1985, Sturludottir și Turner⁶⁰ consideră că declinul *Ulmus*, pe care îl datează în jur de 3450 BC, se datorează în principal deteriorării cuverturii de sol ca urmare a activităților umane de gestionare a spațiilor împădurite, fără însă a deconsidera total rolul celorlalți factori potențiali.

În 1993, analizând palinologic lamine anuale din sedimente lacustre, Peglar și Birks⁶¹ arată că declinul *Ulmus* a avut loc în Sud-Estul Angliei în aproximativ șapte ani și îl datează în jur de 5000 BP. Ținând cont de viteza declinului, ei îl atribuie în principal unui atac patogen, eventual conjugat cu efectul activităților umane.

Revenind la problematica generală a zonărilor palinologice trebuie arătat că cu timpul s-a ajuns ca fiecare regiune să aibă zonarea sa, teoretic paralelizabilă cu una dintre zonările de referință. Tot cu timpul însă, s-au perfecționat și metodele de datare absolută, care au început să fie aplicate pentru stabilirea unor repere cronologice absolute ale diverselor biozonări locale. Rezultatul acestor evoluții a fost dezastruos – biozone ale căror limite ar fi trebuit să fie sincrone nu sunt nici pe departe așa (în tabelul 2 se pot observa diferențele cronologice între limitele mai multor zonări realizate în

⁵⁶ Girling M.A., Greig J. (1985) *A first fossil record for Scolytus scolytus (F.) (elm bark beetle): its occurrence in elm decline deposits from London and the implications for Neolithic elm disease*, Journal of Archaeological Science, 12, 347-351.

⁵⁷ Sturludottir S.A., Turner J. (1985) *The elm decline at Pawlaw Mire: an anthropogenic interpretation*, New Phytologist, 99, 323-329.

⁵⁸ Ten Hove H.A. (1968) *The Ulmus fall at the transition Atlanticum-Subboreal in pollen diagrams*, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 5, 359-369.

⁵⁹ Girling M.A., Greig J., *Op.cit.*

⁶⁰ Sturludottir S.A., Turner J., *Op.cit.*

⁶¹ Peglar S.M., Birks H.J.B. (1993) *The mid-Holocene Ulmus fall at Diss Mere, South-East England - disease and human impact?*, Veget.Hist.Archaeobot., 2, 61-68.

Franța având ca referință zonarea Godwin), iar transformarea lor în cronozone prin stabilirea datelor absolute ale limitelor biozonelor este inutilă pentru că duce la o multitudine de cronozonări. În această situație corelările pe areale mai mari sunt delicate și destul de nesigure.

Concluzia generală este aceea că, depășindu-și perioada de glorie, biozonările palinologice prezintă la ora actuală interes numai pentru corelările – și, eventual, datările relative – la scară restrânsă, locală. Zonele rămân doar un mijloc important de descriere a istoriei vegetației și de corelare a acestei istorii cu variațiile factorilor de mediu. Desigur, variațiile climatice holocene majore au fost unitare cel puțin la scara întregii emisfere nordice, numai că ele s-au reflectat diferit funcție de poziția geografică (latitudine, altitudine). Dacă punem la socoteală și faptul că vegetația asupra căreia variațiile climatice au acționat, modificând-o, diferea funcție de poziția geografică, ne putem da seama de ce este atât de greu să se realizeze corelări la scară mai largă pe baza vegetației. Așa cum arată de Beaulieu⁶² într-o sinteză asupra divizării Holocenului în Franța, axioma care afirmă că schimbările majore ale vegetației în diverse regiuni (ale Europei, de exemplu) sunt sincrone, este o axiomă periculoasă, întrucât dă naștere tentației de a se pune accent pe evenimentele botanice care o satisfac și de a se neglija evenimentele botanice cu caracter diacronic.

Principalul element de corelare ar fi chiar variațiile climatice, însă deși modificările vegetației reflectă variațiile climei, la ora actuală nu s-a elaborat încă o metodă care să permită deducerea exactă a climei pe baza spectrelor polinice (deși încercări există).

Ceea ce recomandă astăzi majoritatea autorilor este definirea de biozonări locale, utilizabile numai la o astfel de scară restrânsă, iar pentru corelările pe areale largi utilizarea datărilor absolute.

6. Puzzle

Așa cum reiese din cele arătate până aici, evoluția climei reprezintă unul dintre puținele procese care au șanse de a furniza un criteriu unitar de divizare a Holocenului. Acest fapt este în acord cu definirea climatică a Holocenului ca epocă a perioadei Cuaternare. O periodizare climatică fină a Holocenului, sprijinită pe datări absolute, ar reprezenta baza ideală pentru interpretări și corelări în tot sistemul disciplinelor ce abordează această perioadă. Așadar, pentru a realiza această bază este nevoie de o cunoaștere cât mai detaliată a evoluției climei.

Mediile (în sens larg) în care se fac reconstituirile climatice trebuie să satisfacă două condiții – să reacționeze la oscilațiile climei și să ofere o înregistrare continuă a semnalului climatic. Cu cât mediul este mai sensibil la variațiile climei, cu atât reconstituirile pe care le oferă vor avea o rezoluție climatică mai mare. Astfel, Frenzel⁶³ arată că variațiile climatice sunt reflectate mult mai clar de evoluția vegetației de la periferia zonei de dezvoltare optimă a unei anumite comunități vegetale, decât de evoluția vegetației din interiorul acestei zone. Un bun exemplu în acest sens îl oferă reconstituirile climatice făcute pe baza oscilațiilor limitei superioare a pădurilor în zonele alpine. În al doilea rând, chiar în cazul înregistrărilor continue, rezoluția temporală diferă de la un mediu la altul și de la un caz la altul. Secvențele sedimentare oceanice vor avea, de exemplu, o rezoluție temporală mult mai mică, datorită ratei de sedimentare reduse, decât secvențele sedimentare din lacurile glaciare. Calotele glaciare au, în schimb, o rezoluție temporală foarte mare, cronostratigrafia lor făcându-se pe baza numărării laminelor anuale de gheață.

⁶² de Beaulieu J.-L., *Op.cit.*

⁶³ Frenzel B. (1966) *Climatic change in the Atlantic/sub-Boreal transition on the Northern Hemisphere: botanical evidence*, Royal Meteorological Society Proceedings of the International Symposium on World Climate from 8000 to 0 B.C., 99–123.

La ora actuală există informații provenind din domenii foarte variate care ar putea forma o imagine destul de detaliată asupra cliimei holocene – problema rezidă în reunirea tuturor acestor informații și corelarea lor. Din păcate slăbiciunea capitală a majorității reconstituirilor paleoclimatice rezidă în chiar logica modului de realizare a lor – pornindu-se de la variația unor mărimi controlate de anumite componente ale cliimei se trag concluzii privind variațiile cliimei în general. Aceasta în condițiile în care în multe cazuri componentele climatice care controlează variația respectivelor mărimi nu sunt bine cunoscute, iar în cazurile pentru care ele sunt cunoscute, nu au fost date (cu foarte rare excepții) funcții de transfer care să le lege prin formule exacte de variațiile acelor mărimi. În cele ce urmează sunt prezentate, ținând cont de cele spuse mai sus, câteva abordări ale reconstituirilor paleoclimatice și aportul lor la cunoașterea evoluției cliimei holocene.

6.1. Nivelul oceanului planetar

Limita inferioară a Holocenului se plasează așadar în linii foarte generale la sfârșitul ultimei glaciațiuni. Ori sfârșitul glaciațiuni este sinonim cu deglaciațiunea – topirea marilor calote glaciare. Această topire a avut ca efect pe de o parte ridicarea nivelului mărilor și oceanelor, cunoscută sub numele de *transgresiune flandriană*, și pe de altă parte ridicarea (glacioizostatică) a regiunilor eliberate de greutatea imenselor mase de gheață.

Ritmul de topire a calotelor glaciare a putut fi reconstituit pe baza variației raportului izotopilor oxigenului în seriile sedimentare oceanice (fig.1). După cum se poate observa, reconstituirile nu coincid din punct de vedere cronologic, fapt ce se poate datora datărilor absolute (ce sunt marcate de un anumit grad de incertitudine în sedimentele marine), dar și diferenței de latitudine (tradusă printr-o apariție mai târzie a apelor de topire la latitudini mici).

Figura 1. Ritmul topirii calotelor glaciare la sfârșitul ultimei glaciațiuni, reconstituit pe baza variației raportului izotopilor oxigenului în succesiunile sedimentare oceanice (A - Atlanticul de Nord, Duplessy et al.; B - Atlanticul ecuatorial, Mix și Ruddiman) după Magny (1995), modificat.

Totuși, ambele diagrame pun în evidență două lucruri importante. Primul este acela că deglaciațiunea a început mult înaintea momentului ce marchează limita inferioară a Holocenului, și anume în jur de 20800 cal.BP⁶⁴, sau chiar mai înainte. Aceasta arată că trasarea limitei inferioare a

⁶⁴ Întrucât ea nu se încadrează în Holocen, diagramele reproduse în fig.1 și 2 nu merg înapoi în timp până la această dată (20800 cal.PB), care este atinsă însă în lucrarea originală (Magny M., *Op.cit.*).

Holocenului la sfârșitul ultimei glaciațiuni este pur orientativă. A doua observație importantă este aceea că topirea calotelor glaciare nu a fost un proces progresiv, așa cum s-a crezut multă vreme, ci unul pulsatoriu, în care etapele de topire rapidă au alternat cu etape de încetinire sau chiar oprire a topirii. Nici din acest punct de vedere reconstituirile nu coincid; acest fapt se poate datora puterii de rezoluție diferite a seriilor sedimentare utilizate în cele două reconstituiri. Cea realizată în Atlanticul de Nord pune în evidență două etape de topire accelerată (notate Ia și Ib), în timp ce reconstituirea realizată în Atlanticul ecuatorial pune în evidență trei etape de topire accelerată (Ia, Ib și Ic) – cu ultima (Ic) mai puțin marcată.

Etapa de încetinire accentuată a topirii calotelor glaciare dintre cele două etape de topire accelerată Ia și Ib ar corespunde ultimului episod de răcire (mult mai blând, totuși, decât maximum glaciațiunii) al glaciului Würm – Dryasul Recent. Atunci începutul Holocenului ar corespunde începutului etapei Ib, a cărei cronologie coincide foarte bine în cele două reconstituiri – el se situează în jur de 11750–11550 cal.BP. Așa cum se observă pe ambele curbe, în jur de 6700–6500 cal.BP volumul calotelor glaciare (și al ghețurilor alpine) atinge deja valori foarte apropiate de cele actuale, iar ritmul deglaciațiunii înregistrează o scădere marcată.

Pe baza reconstituirii ritmului de edificare a recifilor coraligeni din insula Barbados (Antile) – prin datări absolute –, Fairbanks (citat de Magny⁶⁵) a trasat curba ridicării nivelului oceanului planetar în timpul deglaciațiunii (fig.2.A). Pe baza acesteia s-au putut apoi reconstitui variațiile debitului provenit din topirea calotelor glaciare, ce a contribuit la ridicarea nivelului oceanului planetar (fig.2.B). Ambele curbe confirmă că deglaciațiunea a început înainte de 20800 cal.BP și caracterul ei pulsatoriu.

Figura 2. A - Curba ridicării oceanului planetar în timpul deglaciațiunii; B - variațiile debitului provenit din topirea calotelor glaciare, cea a contribuit la ridicarea nivelului oceanului planetar, reconstituiri realizate de Fairbanks pe baza reconstituirii ritmului de edificare a recifilor coraligeni din insula Barbados (Antile) după Magny (1995), modificat.

⁶⁵ Magny M., *op.cit.*

Curba debitului prezintă două maxime (numite *meltwater pulses* IA – la 14400 – și IB – la 10800–11000 cal.BP), ce corespund celor două etape de accelerare marcată a ritmului ridicării nivelului oceanului planetar (notate tot IA și IB). La rândul lor, acestea se corelează foarte bine cu etapele de accelerare a ritmului deglaciațiunii (Ia și Ib) reconstituite în Atlanticul ecuatorial, formând o imagine coerentă. Mai mult decât atât, după meltwater pulse IB, ritmul de ridicare a nivelului oceanului păstrează încă valori relativ mari într-o perioadă ce corespunde etapei de deglaciațiune accelerată Ic, și în care curba debitului apelor provenite din topirea calotelor glaciare, cu alură descendentă după meltwater pulse IB, înregistrează o porțiune de platou.

După scăderea considerabilă înregistrată după meltwater pulse IA, scădere ce corespunde Dryasului Recent, debitul apelor de topire a calotelor glaciare crește marcat începând cu aproximativ 12200 cal.BP, antrenând creșterea ritmului de ridicare a nivelului oceanului planetar începând cu 11800–11700 cal.BP, moment ce ar marca începutul Holocenului. Acest ritm scade considerabil, nivelul oceanului planetar înregistrând valori din ce în ce mai apropiate de cele actuale, în jur de 7300 și mai ales în jur de 5100 cal.BP. Cât despre debitul apelor de topire a calotelor glaciare, acesta atinge valorile actuale, rămânând constant, începând cu aproximativ 5700 cal.BP.

O înregistrare în negativ a ritmului deglaciațiunii este oferită de cordoanele litorale relictice din Peninsula și fiordul Varanger (Nordul Norvegiei). Acestea s-au format în urma retragerii progresive a apelor Mării Barents datorită ridicării glacioizostatice a uscatului, ca efect al topirii calotei glaciare scandinave. Procesul a fost posibil datorită faptului că viteza de ridicare a uscatului eliberat de greutatea calotei glaciare ce se topea, a fost mai mare decât viteza de ridicare a nivelului mării datorată aceluiași fenomen. Corelând vârsta și altitudinea acestor cordoane, Fletcher *et al.*⁶⁶ au putut reconstitui ritmul de coborâre relativă a nivelului mării (fig.3) și, implicit, ritmul deglaciațiunii. Și această reconstituire evidențiază caracterul pulsatoriu al deglaciațiunii. Scăderea rapidă a nivelului mării ce corespunde limitei inferioare a Holocenului începe în jur de 11100 cal.BP. Pe lângă aceasta, se mai evidențiază trei etape de accelerare a ritmului de coborâre relativă a nivelului mării, cuprinse în intervalele 6650–5550, 4700–3950, 2650–1900 cal.BP, și o a patra mai puțin marcată, ce începe în jur de 1300–1250 cal.BP; ultimele trei se datoresc probabil mai degrabă unor cauze endogene ce controlează procesele de izostazie, decât topirii calotei glaciare, având în vedere că aceasta din urmă s-a consumat până în 5100 cal.BP (cel mai târziu).

Toate aceste informații legate de procesele de topire a marilor calote glaciare și de variațiile nivelului oceanului planetar sugerează că limita inferioară a Holocenului ar putea fi trasată la începutul etapei de creștere accentuată și relativ bruscă a ritmului de topire a calotelor glaciare (Ib), a debitului apelor de topire (IB) și a ritmului de ridicare a nivelului oceanului planetar (IB). În acest caz, ea s-ar plasa undeva între 12200 și 11100 cal.BP.

Deglaciațiunea, declanșată cu mult înaintea începutului Holocenului și anume cel mai târziu în jur de 20800 cal.BP, se dovedește a fi un proces pulsatoriu, cu etape de accelerare și etape de încetinire. Astfel, după încetinirea marcată ce corespunde ultimei recurențe a glaciului Würm (Dryasul receat), ritmul deglaciațiunii se accelerează puternic odată cu începutul Holocenului, pentru ca apoi să scadă progresiv (dar nu fără accelerații și încetiniri de mai mică amploare). Între 6700–5100 cal.BP, procesele legate de deglaciațiune încetinesc foarte puternic sau chiar încetează, nivelul oceanului planetar atingând valori foarte apropiate de cele actuale.

⁶⁶ Fletcher C.H. III, Fairbridge R.W., Moller J.J., Long A.J. (1993) *Emergence of the Varanger Peninsula, Arctic Norway, and climate changes since deglaciation*, *The Holocene*, 3, 2, 116–127.

Figura 3. Reconstituirea scăderii relative a nivelului mării corespunzătoare deglaciațiunii, pe baza cordonelor litorale relict din Nordul Norvegiei; A - tărmul nord-estic și sud-estic al Peninsulei Varanger; B - tărmul sudic al fiordului Varanger (după Fletcher et al., 1993)

6.2. Timberline

Palinologia nu este încă în măsură să realizeze în mod direct o reconstituire detaliată a evoluției cliimei. Ea poate pune în evidență doar tendințele pe termen lung ale acesteia, informație necesară, dar nu suficientă pentru demersul avut în vedere mai sus (6.). Această situație se datorește faptului că metodele propuse până în prezent pentru a pune în relație directă structura unui spectru polinic și clima pe care acesta o reprezintă⁶⁷, nu sunt încă bine puse la punct.

Faptul de a fi reconstituit liniile generale ale evoluției cliimei Holocene constituie totuși un merit incontestabil al palinologiei. După cum aminteam într-un paragraf precedent (5.3.), astfel au fost puse în evidență o perioadă de încălzire climatică, o perioadă de așa-zis optimum⁶⁸ climatic,

⁶⁷ Pons A. (1990) *Analyse pollinique et reconstitution quantitative du climat*, in Reille M., *Lecons de palynologie et d'analyse pollinique*, Editions du CNRS, 187-197, Huntley B. (1992). *Pollen-climate response surfaces and the study of climate change*, in Gray J.M. (ed.) *Applications of Quaternary Research*, Quaternary Proceedings, 2, Quaternary Research Association, Cambridge, 91-99 și alții.

⁶⁸ Expresia *optimum climatic* nu este foarte bine aleasă, întrucât definirea unui optimum presupune un punct de vedere fix și bine definit – optimum pentru ce sau pentru cine? La fel, expresia *ameliorare climatică* (referitoare la perioadele de încălzire) este, așa cum consideră și Ammann et al., un termen antropocentric – o astfel de perioadă poate dăuna populațiilor vegetale sau animale adaptate la frig; Ammann B., Andrée M., Chaix L., Eicher U., Elias S.A., Hofmann W., Oeschger H., Siegenthaler U., Tobolski K., Wilkinson B., Zülig H. (1985) *An attempt at a palaeoecological synthesis*, in Lobsigensee – Late-glacial and Holocene environments of a lake on the Central Swiss Plateau, Diss.Bot. 87, J.Cramer, Vaduz, 165-170.

urmată de o altă de răcire a climei sau, așa cum bine le-a denumit von Post, perioada de apropiere a timpului călduros, perioada de culminare a timpului călduros și perioada de descreștere a căldurii.

Totuși, palinologia poate contribui, indirect, la reconstituirea mai detaliată a oscilațiilor climatice. Spre deosebire de zonele de câmpie, unde echilibrul dintre diferitele comunități de plante este mai stabil datorită faptului că variațiile climatice nu sunt abrupte, în zonele de munte, unde oscilațiile climatice sunt mult mai bruște, vegetația, aflată într-un echilibru mai instabil, reacționează prompt la aceste oscilații⁶⁹. Un astfel de fenomen este reprezentat de oscilațiile altitudinii limitei superioare a etajului de vegetație subalpin, limită ce coincide, practic, cu limita superioară a vegetației lemnoase – *timberline*⁷⁰. Oscilațiile *timberline* pot fi puse în evidență prin urmărirea variațiilor raportului AP/NAP⁷¹ în sedimentele lacurilor și turbăriilor situate în zona tranziției de la etajul de vegetație alpin la cel subalpin. Astfel, scăderea valorilor raportului AP/NAP indică îndepărtarea plantelor lemnoase de punctul de probare, deci coborârea *timberline*, în timp ce creșterea valorilor acestui raport indică ridicarea *timberline*. Desigur, pentru a se elimina efectele unor fenomene locale sau aleatorii, ce pot masca variațiile determinate climatic ale raportului AP/NAP, trebuie coroborate rezultatele studiilor efectuate în cât mai multe puncte. Astfel s-au reconstituit oscilațiile *timberline* în Alpi (fig.4.A–D).

Oscilațiile *timberline* pot fi reconstituite și pe baza altor informații. În Alpii italieni ele au fost puse în evidență pe baza ocurențelor de frunze (ace de conifere) sau fragmente de epidermă foliară în lacuri și turbării⁷². Karlén și Kuylenstierna⁷³ folosesc datările resturilor lemnoase de *Pinus sylvestris* descoperite la diverse altitudini pentru a reconstitui oscilațiile *timberline* în Peninsula Scandinavă (fig.4.E).

În principiu, coborârea *timberline* reflectă o răcire a climei, iar ridicarea *timberline* o încălzire a climei. Frenzel⁷⁴ consideră că poziția limitei superioare a pădurilor montane este controlată de posibilitatea plantelor de acumula în perioada estivală (perioadă vegetativă) suficiente materii nutritive pentru a-și asigura supraviețuirea. Cu cât altitudinea este mai mare, cu atât rigorile climei determină o perioadă vegetativă mai scurtă. În cazul pădurilor de pin din Suedia, Karlén și Kuylenstierna⁷⁵ citează ca principal factor ce controlează poziția *timberline* temperatura estivală, care determină altitudinea maximă la care pot germina semințele de pin. Într-adevăr, coborârea *timberline* este cauzată nu atât de înăsprirea rigorilor iernii, cât mai ales de diminuarea temperaturii medii din timpul perioadei vegetative și de scurtarea duratei acestei perioade. În aceste condiții, spre exemplu, învelișul cuticular al frunzelor coniferelor nu are timp să se desăvârșească, ceea ce duce la o pierdere treptată a frunzișului (care nu se mai înnoiește) și în final la moartea arborilor⁷⁶.

Prin urmare, perioadele de avansare (ridicare) a *timberline* trebuie interpretate ca perioade de incidență crescută a verilor mai calde și mai lungi, iar perioadele de retragere (coborâre) a *timberline*, ca intervale cu frecvență crescută a verilor reci și scurte.

⁶⁹ Frenzel B., *Op.cit.*.

⁷⁰ Deși termenul nu este consacrat în limba română, el va fi folosit în cele ce urmează pentru a desemna *limita superioară a vegetației lemnoase* (de la tranziția între etajele de vegetație subalpin și alpin), sintagmă a cărei utilizare frecventă ar afecta serios cursivitatea textului.

⁷¹ AP – polen de arbori (*arboreal pollen*); NAP – polen de erbacee (*non arboreal pollen*).

⁷² Schneider R. (1985) *Palyndologic research in the southern and southeastern Alps between Torino and Trieste. A review of investigations concerning the last 15,000 years*, Diss.Bot. 87, J.Cramer, Vaduz, 23–103.

⁷³ Karlén W., Kuylenstierna J. (1996) *On solar forcing of Holocene climate: evidence from Scandinavia*, The Holocene, 6, 3, 359–365.

⁷⁴ Frenzel B., *Op.cit.*.

⁷⁵ Karlén W., Kuylenstierna J., *Op.cit.*.

⁷⁶ Magny M., *Op.cit.*.

Figura 4. Oscilațiile limitei superioare a pădurilor în Alpii austrieci (A), elvețieni (B, C) și francezi (D) - Magny (1995) - și în Peninsula Scandinavă (E) - Karlén, Kuylenstierna (1996); oscilațiile limitei nordice a pădurilor în Canada (F), după mai mulți autori - Magny (1995) (A-D, F - cronologie radiocarbon; E - cronologie solară; D, E - în alb avansări ale timberline, în negru retrageri; scările amplitudinilor diferă de la un grafic la altul).

Din punct de vedere cantitativ Karlén și Kuylenstierna⁷⁷ estimează că pentru Peninsula Scandinavă o avansare a timberline cu 100 de metri corespunde unei creșteri a temperaturii medii estivale cu 0,6°C. Magny⁷⁸ citează rezultatele unor studii efectuate în Alpi, conform cărora scăderea temperaturii medii estivale cu 1,5°C, corelată cu scurtarea cu 5 săptămâni a perioadei vegetative, ar avea ca efect o retragere a timberline cu 200 de metri în 10 ani. Aceste estimări au totuși o semnificație restrânsă, locală, valorile lor depinzând de diverși factori proprii regiunilor respective, și nu pot fi extrapolate pe areale mai largi.

Tot pe baza analizelor polinice efectuate în sedimentele turbăriilor și lacurilor au fost reconstituite și oscilațiile latitudinale ale limitei nordice a pădurilor în Canada (fig.4.F). Aceste oscilații trebuie să fie controlate, în linii mari, de aceleași procese ca și oscilațiile timberline.

⁷⁷ Karlén W., Kuylenstierna J., *Op.cit.*

⁷⁸ Magny M., *Op.cit.*

Pentru a încerca o interpretare a curbilor și diagramelor ce reconstituie oscilațiile timberline (ca și cele ale limitei nordice a pădurilor nord-americane), trebuie stabilită exact semnificația climatică a acestor reprezentări grafice. Tentația imediată atunci când se paralelizează astfel de curbe este de a se corela momentele de maxim și minim relativ. Cu toate că această operațiune nu este inutilă, nu trebuie uitat că, deși reflectă variațiile cliimei, curbele nu reconstituie direct variații ale temperaturii (umidității, etc.), ci strict oscilații ale poziției timberline. Prin urmare, punctele de maxim și minim ale curbilor, asociate unor poziții analoage ale timberline, reprezintă de fapt momente de tranziție. Astfel, un maxim relativ al poziției timberline, de exemplu, reprezintă momentul de trecere de la o perioadă de incidență crescută a verilor mai calde și mai lungi, ce a dus la avansarea timberline, la o perioadă în care verile reci și scurte înregistrează frecvențe mărite, și care va amorsa retragerea timberline. Altfel spus, perioadele cea mai reci nu sunt reprezentate de punctele de minim relativ, unde panta curbei este zero, ci de porțiunile cu pantă maximă ale curbilor. O astfel de porțiune indică viteza maximă de retragere a timberline, corespunzând intervalului în care verile scurte și reci au atins frecvența maximă. În aceeași ordine de idei, o porțiune de maxim sau de minim corespunde unui interval în care verile calde și lungi și verile scurte și reci înregistrează frecvențe aproximativ egale. Maximele și minimele sunt importante, așadar, mai ales prin amplitudinea lor, care reflectă intensitatea fenomenelor – de exemplu scurtarea și răcirea verilor sau frecvența absolută a verilor scurte și reci.

Având în vedere aceste principii de interpretare, pe baza curbilor și diagramelor din fig.4 s-au trasat diagrame⁷⁹ care redau tocmai succesiunea perioadelor de avansare a timberline (frecvență mărită a verilor lungi și calde) – porțiunile ascendente ale curbilor – și de retragere a timberline (frecvență mărită a verilor scurte și reci) – porțiunile descendente ale curbilor –, făcându-se abstracție de valorile absolute ale maximelor și minimelor (fig.5.A–F). Întrucât datele din fig.4 sunt raportate atât la calendarul radiocarbon (A–D și F), cât și la calendarul solar (E), pentru ca ele să poată fi corelate s-au calibrat⁸⁰ cronologiile diagramelor.

Oscilațiile timberline în Alpi (fig.4 A–C) reflectă în linii mari cele trei perioade ale evoluției cliimei holocene. Se observă că timberline avansează mai mult sau mai puțin rapid pentru a atinge un maxim absolut, iar apoi prezintă o tendință de retragere, nu foarte accentuată. Maximele absolute trebuie privite ca momente de graniță între două tendințe climatice – o primă perioadă în care, per total, verile mai calde și mai lungi sunt mai frecvente, și o a doua în care verile mai reci și mai scurte devin per total mai frecvente.

Timberline a atins pozițiile cele mai înalte în jur de 7900 cal.BP în Alpii austrieci, 6300 cal.BP în Alpii elvețieni și 4200 cal.BP în Alpii francezi. În Alpii austrieci maximul absolut este urmat de două peak-uri apropiate ca valoare, toate trei încadrate în perioada 8500–4200 cal.BP, iar în Alpii elvețieni o

⁷⁹. Segmentele albe ale diagramelor din fig.5.A–F, 7.A–E, I și 8.A–C reprezintă perioade (i) de avansare (ridicare) a timberline, (ii) de retragere (ridicare) a snowline, (iii) de nivel coborât al lacurilor și (iv) cu veri calde, lungi și secetoase (funcție de caz). Analog, segmentele negre ale diagramelor reprezintă perioade (i) de retragere (coborâre) a timberline, (ii) de avansare (coborâre) a snowline, (iii) de nivel ridicat al lacurilor și (iv) cu veri reci, scurte și ploioase (funcție de caz). Efilările mai mult sau mai puțin accentuate ale unora dintre segmentele diagramelor se datoresc fie faptului că maximele sau minimele ce defineau capetele intervalelor apăreau ca porțiuni de platou ale curbilor utilizate, fie curbei de calibrare, care pentru datarea respectivă ofereau mai multe variante. Diagramele prezintă două variante acolo unde și graficele originale prezentau două variante.

⁸⁰ Datorită variațiilor concentrației izotopului ^{14}C în atmosferă de-a lungul timpului, cronologia radiocarbon nu coincide cu cronologia reală (solară). Astfel, funcție de perioada care este luată în considerație, un an radiocarbon poate fi mai lung sau mai scurt ca un an solar. Calibrarea constă tocmai în asocierea unei vârste reale (în ani solari) fiecărei datări radiocarbon. Datele utilizate în trasarea diagramelor (fig.5.A–F, 7.A–E, I. și 8.A–C.) au fost obținute prin calibrarea datărilor ^{14}C din graficele diferiților autori, cu ajutorul curbilor de calibrare publicate de Stuiver și Reimer; Stuiver M., Reimer P.J. (1994) *CALIB 3.0.3A. Manuel sur l'utilisation du programme de calibration et commentaires utiles*, Centre de Datation par le Radiocarbone, Villeurbanne Lyba.

situație similară a fost pusă în evidență pentru perioada 6300–4200 cal.BP; în Alpii francezi maximul absolut este foarte slab evidențiat în cadrul unui platou (porțiune cu pantă foarte mică a curbei) de avansare maximă a timberline datat 4600–2900 cal.BP.

Figura 5. Succesiunea perioadelor de avansare (în alb) și retragere (în negru) a timberline; A-F ca în fig. 4 (diagramele prezintă două variante acolo unde și cele din fig. 4 prezintă două variante; efilările se datorează fie calibrărilor, fie porțiunilor de platou ale curbelor); G - diagrama generală; H - numărul de diagrame pe care se bazează diagrama generală; I - succesiunea perioadelor cu frecvență mărită a verilor lungi și calde (în alb) și cu frecvență mărită a verilor scurte și reci (în negru), sintetizate pe baza oscilațiilor timberline pentru Europa (și emisfera nordică începând cu aproximativ 7500 cal.BP).

Se observă că poziția cronologică a maximelor absolute diferă destul de mult în cele trei regiuni ale Alpilor. Aceste diferențe se pot datora atât impreciziei reconstituirilor cantitative – vezi cazul Alpilor austrieci și elvețieni cu câte trei peak-uri de valori foarte apropiate, unul dintre ele reprezentând maximul absolut –, cât și poziției geografice, care determină gradul de continentalitate al climatei.

Cercetările efectuate de Karlén și Kuylenstierna⁸¹ arată că în Peninsula Scandinavă timberline atinsese deja altitudini înalte la scurt timp după sfârșitul Würmului. Ei datează maximul absolut al altitudinii timberline în jur de 5700 cal.BP, încadrându-l într-un interval de optimum – 7800–5100 cal.BP.

Limita nordică a pădurilor din Canada a atins latitudinea cea mai înaltă în jur de 5800–5700 cal.BP, după care tendința generală a fost de retragere spre sud.

⁸¹ Karlén W., Kuylenstierna J., *Op.cit.*

În linii mari se poate spune deci că în emisfera nordică trecerea de la perioada cu frecvență crescută a verilor calde și lungi la perioada cu frecvență crescută a verilor reci și scurte a avut loc în intervalul 7900–4200 cal.BP. Perioada de echilibru relativ între cele două tendințe, în care timberline s-a menținut la altitudinile cele mai ridicate reprezintă perioada cea mai caldă. Ea acoperă intervalul 8500–2900 cal.BP, diferind de la o regiune la alta, dar pentru Europa privită ca întreg această perioadă se încadrează între 6300 și 4200 cal.BP. Maximul avansării către nord a pădurilor canadiene se încadrează în acest interval și, mai mult, este aproape contemporan cu maximul avansării timberline în Peninsula Scandinavă.

Toate aceste rezultate se referă numai la tendințele generale ale evoluției climei holocene. Graficele din fig.4 arată însă că pe fondul acestor tendințe generale au avut loc frecvente oscilații ale timberline și, implicit, ale climei. Pentru a putea corela aceste oscilații, ele au fost reprezentate sub forma descrisă mai sus, în fig.5 A–F.

Prima impresie este aceea a unei corelări destul de slabe. Acest lucru nu este de mirare, având în vedere decalajele cronologice date de diferențele de poziție geografică. Tot poziția geografică determină și sensibilitatea oscilațiilor timberline la oscilații climatice de diferite amplitudini; o astfel de diferență de sensibilitate poate face ca o porțiune de platou a curbei reconstituite pentru o anumită regiune să fie reprezentată într-o regiune cu sensibilitate mai mare printr-o succesiune de maxime și minime relative cu amplitudini reduse. Situațiile de acest gen pot avea drept cauză și puteri de rezoluție cronologică diferite ale diverselor secvențe stratigrafice care furnizează informația brută. În plus, nu trebuie uitat că datările radiocarbon nu dau vârste exacte, ci intervale de timp în care vârsta eșantionului datat are cele mai mari șanse să se situeze, intervale uneori destul de largi (chiar 200–300 de ani); în aceste condiții este clar că precizia cronologică a curbelor trasate nu este cea mai bună. La toate acestea se adaugă și faptul că modul de reprezentare a datelor prin împărțirea curbelor în porțiuni ascendente și descendente, cu toate avantajele pe care le prezintă în principiu, face abstracție de panta curbelor, ceea ce poate duce la erori mari în zonele cu pantă redusă ale acestora.

Pentru a depăși blocajul generat de slaba corelare a datelor din fig.5 A–F, le-am reunit într-o singură diagramă generală⁸² (fig.5 G), care însumează intervalele de avansare a timberline (în alb) și intervalele de retragere a timberline (în negru) pentru toate regiunile luate în considerare (inclusiv oscilațiile limitei nordice a pădurilor canadiene).

Imaginea generală la scara Europei (și a emisferei nordice, începând cu aproximativ 7500 cal.BP) ce reiese din această diagramă, include (vezi diagrama sintetică⁸³ din fig.5.I):

- ♦ perioade de avansare a timberline, reprezentând intervale cu frecvență mărită a verilor calde și lungi – 12050–10950 (cu un maxim în jur de 11150), 10700–9750 (cu maxime în jur de 10450, 10100), 9600–9200, 8850–7700 (cu maxime în jur de 8500, 8000), 7500–7300, 7100–5600 (cu maxime în jur de 7000–6800 și 5950–5800), 5200–4000

⁸² Diagramele generale (fig.5.G, 7.F și 8.D) au fost construite prin reunirea segmentelor albe (pe de o parte) și negre (pe de altă parte) ale diagramelor simple, ținând cont de cronologia acestora. Acolo unde diagramele simple prezentau efilări ale unor segmente, s-au utilizat lungimile maxime, atât pentru segmentele albe, cât și pentru cele negre. La fel, în cazurile când diagramele prezentau două variante s-au ales, atât în cazul segmentelor albe, cât și în cazul celor negre, pentru fiecare în parte, variantele care prezentau lungimea maximă.

⁸³ Diagramele sintetice (fig.5.I, 7.H, J și 8.E) s-au obținut prin Intersectarea Informației din diagramele generale, în sensul că s-au reprezentat prin segmente albe intervalele pentru care în diagrama generală segmentele albe sunt mai numeroase ca cele negre, și prin segmente negre intervalele pentru care segmentele negre sunt mai numeroase ca cele albe. Intervalelor din diagramele generale pentru care numărul segmentelor albe este egal cu numărul segmentelor negre, le corespund în diagramele sintetice intervale libere.

(cu maxime în jur de 5000, 4600 și 4200), 2000–1400 (cu maxime în jur de 1900 și 1650) și 1150–800 (cu un maxim în jur de 1000 cal.BP);

♦ perioade de retragere a timberline, deci intervale cu incidență crescută a verilor reci și scurte – 12400–12100, 10900–10700, 9200–8850, 5600–5350, 4000–3400 (cu un minim în jur de 3800), 3300–2050 (cu un minim în jur de 2800), 1350–1200 și 800–300 (cu două minime în jur de 700 și 500 cal.BP).

6.3. Snowline

Mișcările de avansare și retragere a ghețarilor alpini reflectă variațiile masei acestora. Când masa ghețarului se mărește, limita lui inferioară – *snowline*⁸⁴ – avansează (deci coboară), ghețarul acoperind noi suprafețe; când masa ghețarului scade, limita inferioară se retrage (se ridică) – în urma sa rămân depozite morenice. Prin datarea resturilor vegetale prinse în interiorul morenelor și a solurilor fosile acoperite de acestea, se poate reconstitui cronologia avansărilor și retragerilor ghețarilor, deci a variațiilor bilanțului de masă al acestora.

În cazul când aval de ghețar există lacuri sau mlaștini proglaciare alimentate de acesta, sedimentarea din aceste cuvete va fi influențată de oscilațiile limitei ghețarului. Dacă bilanțul de masă al ghețarului este pozitiv, odată cu avansarea acestuia se intensifică și activitatea torenților formați în fruntea ghețarului. Aceasta duce la un excedent în bilanțul hidric al lacului și la o sedimentare minerală, cu formare de varve⁸⁵, pe fundul acestuia; ghețarul poate uneori să acopere cuveta lacustră, lăsând acolo la retragerea sa chiar sedimente mai grosiere. Un deficit al bilanțului de masă al ghețarului are ca efect o diminuare a activității torenților din fruntea sa și un deficit în bilanțul hidric al lacului. Ca urmare, în cuvetă începe să se formeze turbă⁸⁶.

După Karlén și Kuylenstierna⁸⁷ bilanțul de masă al ghețarilor depinde în principal de doi parametri climatici – cantitatea precipitațiilor de iarnă și temperaturile estivale, ce controlează intensitatea topirii. Observațiile efectuate în secolul nostru au arătat că în general temperaturile estivale primează ca pondere, cu excepția regiunilor cu climă accentuat oceanică, unde bilanțul de masă al ghețarilor este influențat în special de nivelul precipitațiilor de iarnă.

Observațiile efectuate pe indivizi de *Larix* ce se dezvoltă în văi alpine au arătat că densitatea lemnului din inelele anuale de creștere ale arborilor variază în același sens cu temperaturile estivale. Prin compararea rezultatelor măsurărilor de densitometrie a lemnului cu informațiile despre oscilațiile snowline, s-a putut stabili că acestea din urmă sunt influențate în principal de temperaturile estivale. Avansările ghețarilor sunt determinate de veri reci și umede, în timp ce retragerile sunt determinate de temperaturi estivale mai mari, în special la sfârșitul sezonului⁸⁸ – un rol decisiv îl au temperaturile din Septembrie.

Așadar retragerea (ridicarea) snowline, deci un bilanț de masă deficitar al ghețarilor, este efectul unui interval de timp cu frecvență crescută a verilor mai calde și mai uscate decât media, și eventual mai lungi (*indian summer*). Invers, un excedent în bilanțul de masă al ghețarilor, și prin urmare

⁸⁴ Pentru a asigura cursivitatea textului, termenul *snowline* va fi folosit în cele ce urmează pentru a desemna limita inferioară a ghețarilor alpini.

⁸⁵ Varvele reprezintă depozite (în general lacustre) fin laminate, a căror sedimentare este controlată de ritmuri sezoniere.

⁸⁶ Magny M., *Op.cit.*

⁸⁷ Karlén W., Kuylenstierna J., *Op.cit.*

⁸⁸ Magny M., *Op.cit.*

avansarea (coborârea) snowline, este efectul unui interval de deteriorare a condițiilor climatice estivale – frecvență mare a venilor cu temperaturi medii scăzute, nivel ridicat al precipitațiilor și mai scurte.

Iată cum oscilațiile snowline furnizează informații asupra variațiilor climei. Din păcate aceste informații sunt numai calitative, întrucât deși bilanțul de masă al ghețarilor variază în același sens sub influența variațiilor climatice pe termen lung, viteza lui de răspuns depinde și de alți factori, cum ar fi poziția geografică a ghețarului. Astfel, Magny⁸⁹ arată că deși între 1950 și 1980 temperaturile medii estivale au scăzut cu 1°C, iar precipitațiile medii anuale au crescut cu 3–4%, doar 75% din ghețarii alpini monitorizați în Elveția și Austria au avansat. În plus, clima reprezintă o imagine alcătuită prin alăturarea mai multor elemente meteorologice (temperatură, precipitații etc.), elemente ale căror variații își pot anula reciproc unele efecte. Spre exemplu, din punctul de vedere al oscilației snowline, o creștere cu 100 mm a precipitațiilor de iarnă poate fi compensată de o creștere cu 0,2°C a temperaturilor estivale.

Coroborând și prelucrând date provenite de la mai mulți autori, Wigley și Kelly⁹⁰ propun cronologii sintetice ale oscilațiilor snowline la scara celor două emisfere ale globului, ca și la scara întregului glob (fig.6.A–C). Cronologiile reprezintă medii obținute prin ponderarea datelor locale funcție de poziția geografică; după cum observă însă autorii, datorită faptului că cronologiile locale se corelează strâns, cronologiile sintetice depind foarte puțin de ponderile luate în calcul. Așa cum se poate observa, cele trei cronologii sintetice se corelează foarte bine.

Zagwijn⁹¹ redă oscilațiile snowline – reconstituite de Nesje și colab. și de Furrer în 1991 – pentru Norvegia centrală și Alpii elvețieni (fig.6.D și G). Pentru Alpii austrieci, Magny⁹² redă reconstituirea oscilațiilor snowline realizată de Bortenschlager (în 1994) – fig.6.F. Același autor prezintă și diagrama variației pe verticală a granulometriei sedimentelor lacului Silvaplana din Alpii elvețieni – indicator pentru variațiile bilanțului de masă al ghețarului care l-a alimentat (fig.6.H). În sfârșit, Karlén și Kuylensstierna⁹³ prezintă o reconstituire a oscilațiilor snowline din Scandinavia (fig.6.E).

Ca și în cazul oscilațiilor timberline, perioadele de maxim sau minim al poziției snowline sunt mai puțin interesante, ele reprezentând momente de tranziție, în care cele două teridinte ce controlează poziția snowline au ponderi aproximativ egale. De aceea, pe baza unor argumente analoage celor expuse în cap.6.2., am considerat mai utilă pentru corelări reprezentarea oscilațiilor snowline sub forma succesiunii perioadelor de avansare (coborâre) – în negru – și retragere (urcare) – în alb (fig.7.A–E, I); totodată s-a operat și calibrarea cronologiilor acestor diagrame.

Liniile generale ale evoluției poziției snowline reies cel mai clar din diagramele trasate pentru Norvegia centrală (fig.6.D) și lacul Silvaplana (fig.6.H). Se poate observa o retragere (ridicare) rapidă a snowline începând în jur de 10000 cal.BP; în lacul Silvaplana aceasta coincide cu încetarea sedimentării de varve, caracteristică perioadelor mai reci. În continuare snowline ocupă poziții realtiv înalte, oscilând însă, așa cum o arată datele din lacul Silvaplana. Ea începe să avanseze (coboare) în jur de 5500–4500 cal.BP (când în lacul Silvaplana se reia sedimentarea varvelor).

⁸⁹ Ibidem.

⁹⁰ Wigley T.M.L., Kelly P.M. (1990) *Holocene climatic change, ¹⁴C wiggles and variations in solar irradiance*, Phil.Trans.R.Soc.Lond., A330, 547-560.

⁹¹ Zagwijn W.H. (1994) *Reconstruction of climate change during the Holocene in western and central Europe based on pollen records of indicator species*, Veget.Hist.Archaeobot., 3, 65-88.

⁹² Magny M., *Op.cit.*

⁹³ Karlén W., Kuylensstierna J., *Op.cit.*

Diagrama generală (fig.7.F) obținută prin reunirea celor cinci diagrame (fig.7.A–E) prezintă oscilațiile snowline la scara Europei. Din ea reiese succesiunea unor intervale de retragere și de avansare a snowline (fig.7.H):

Figura 6. Oscilațiile snowline în emisfera nordică (A), emisfera sudică (B) și la scara globului (C) - Wigley, Kelly (1990) -, în Norvegia centrală (D) - Zagwijn (1994) -, Peninsula Scandinavă (E) - Karlén, Kuylenstierna (1996) -, Alpii austrieci (F) - Magny (1995) -, Alpii elvețieni (G) - Zagwijn (1994) - și variația granulometriei sedimentelor lacului Silvaplana din Alpii elvețieni (H) - Magny (1995) (A-D, F-H - cronologie radiocarbon; E - cronologie solară; E - în negru avansări ale snowline; scările amplitudinilor diferă de la un grafic la altul).

- ♦ perioade de retragere a snowline – 12150–10500, 9600–9450, 9300–9150, 8900–7800 (cu două maxime în jur de 8700–8600 și 8050), 7500–7350, 6950–6700, 6050–5900, 5100–4600 (cu un maxim în jur de 4700), 3000–2850, 2400–2100, 1150–950 și 300–0 cal.BP;
- ♦ perioade de avansare a snowline – 10300–10150, 9450–9300, 7750–7500, 7350–7050, 6700–6100, 5900–5150 (cu un maxim în jur de 5500), 4550–3000 (cu maxime în jur de 4350, 3950 și 3400), 2850–2500, 2100–1150 (cu maxime în jur de 1900, 1600 și 1350) și 950–350 (cu maxime în jur de 700 și 500 cal.BP).

Corelând aceste date cu cele ale reconstituirii realizate de Wigley și Kelly⁹⁴ pentru oscilațiile snowline în emisfera nordică (fig.7.I), se obține (prin intersectarea celor două diagrame) o imagine generală la scara emisferei nordice (fig.7.J), ce include:

- ♦ perioade de retragere a snowline, reprezentând intervale cu frecvență mărită a verilor calde și uscate (eventual mai lungi) – 12150–11100, 10200–10000, 9650–9450, 9300–8700, 8300–7750, 7050–6700, 5150–4600 și 300–0 cal.BP;
- ♦ perioade de avansare a snowline, deci intervale cu incidență crescută a verilor reci și umede (și scurte) – 10500–10200, 9900–9650, 8700–8300, 7700–7500, 7350–7100, 6550–6400, 6300–6050, 5700–5400, 5300–5150, 4400–3900, 3700–3400, trei perioade foarte apropiate în intervalul 1700–1150 și alte trei în intervalul 900–350 cal.BP.

Figura 7. Succesiunea perioadelor de avansare (în alb) și retragere (în negru) a snowline; A - Norvegia centrală; B - Peninsula Scandinavă; C - Alpii austrieci; D - Alpii elvețieni; E - pe baza granulometriei sedimentelor lacului Silvaplana din Alpii elvețieni (diagramele prezintă două variante acolo unde și cele din figura 6 prezintă două variante; efilările se datorează fie calibrării, fie porțiunilor de platou ale curbelor); F - diagrama generală; G - numărul de diagrame pe care se bazează diagrama generală; H - diagrama sintetică a oscilațiilor snowline în Europa; I - oscilațiile snowline în emisfera nordică (după figura 6.A.); J - succesiunea perioadelor cu frecvență mărită a verilor calde și uscate (eventual mai lungi) - în alb - și cu frecvență mărită a verilor reci și umede (și scurte) - în negru - în emisfera nordică, sintetizate pe baza datelor din figura 7 H și I.

⁹⁴ Wigley T.M.L., Kelly P.M., *Op. cit.*

6.4. Nivelul lacurilor

Variațiile nivelului lacurilor pot fi puse în evidență prin urmărirea ocurențelor unor markeri batimetrice în seriile sedimentare lacustre. Schneider și Tobolski⁹⁵ utilizează ca markeri batimetrice macroresturile plantelor higrofile și hidrofile, împărțite în trei clase – (i) ogoane de *Characeae*, (ii) semințe și fructe de *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum* și *Potamogeton natans* și (iii) fragmente de radicele, rizomi și epidermă de *Cyperaceae*, *Phragmites* și *Schoenoplectus lacustris*. Urmărind frecvența resturilor din cele trei clase de-a lungul unui profil prin sedimentele Lago di Ganna (Italia, Sudul Alpilor), ei realizează o reconstituire calitativă a variațiilor nivelului acestui lac (fig.8.A).

Figura 8. Oscilațiile nivelului Lago di Ganna (Italia, Sudul Alpilor) (A) - după Schneider și Tobolski (1985), modificat; lacurilor glaciare din Jura (B) și lacului Bysjön (Sudul Suediei) (C) - după Magny (1995), modificat; diagrama generală reprezentativă pentru oscilațiile nivelului lacurilor din Europa de Nord-West (D); în alb faze regresive, în negru faze transgresive; succesiunea perioadelor cu frecvență mărită a verilor uscate, calde și eventual mai lungi - în alb - și cu frecvență mărită a verilor umede și reci (și scurte) - în negru -, sintetizate pe baza oscilațiilor nivelului lacurilor (E).

În studiul său, Magny⁹⁶ ia în considerare mai mulți indicatori ai batimetriei lacurilor. Conținutul de materie organică (de origine vegetală) scade odată cu creșterea adâncimii; în schimb, în zonele mai adânci se depun crete lacustre. Granulometria sedimentelor scade și ea odată cu creșterea adâncimii. Frecvențele diverselor morfotipuri de concrețiuni carbonatice care formează fracțiunea arenitică a cretelor lacustre, variază și ele funcție de adâncime. În sfârșit, geometria secvențelor sedimentare lacustre poate da indicații asupra variațiilor nivelului lacurilor. În ciuda multitudinii surselor de informație, coroborarea tuturor acestor informații permite numai reconstituirea calitativă a oscilațiilor nivelului lacurilor, și aceasta datorită diferențelor induse de influența majoră pe care o exercită topografia lacurilor și caracteristicile bazinului lor hidrografic asupra sedimentării. Aceste influențe fac ca sedimentarea să difere nu numai de la un lac la altul, ci și în cadrul aceleiași cuvete lacustre.

Analizând seriile sedimentare din 24 de lacuri, Magny realizează o reconstituire calitativă sintetică a oscilațiilor nivelului lacurilor din Jura (fig.8.B). Același autor prezintă și reconstituirea

⁹⁵ Schneider R., Tobolski K. (1985) *Lago di Ganna – late-glacial and holocene environments of a lake in the Southern Alps*, Diss.Bot. 87, J.Cramer, Vaduz, 229–271.

⁹⁶ Magny M., *Op.cit.*

realizată de Digerfeldt pentru Lacul Bysjön, considerată ilustrativă pentru oscilațiile nivelului lacurilor din Sudul Suediei (fig.8.C).

Un aspect important al fluctuațiilor nivelului lacurilor este acela că așa-zisele perioade de nivel scăzut, adică fazele regresive, nu reprezintă de fapt intervale de timp când nivelul lacului a fost scăzut în mod constant, ci perioade în timpul cărora etajele estivale erau mai frecvente și mai pronunțate. Analog, fazele transgresive reprezintă perioade cu frecvență mare a creșterilor nivelului lacului.

Ce aspecte ale climei sunt reflectate de aceste oscilații? Bilanțul hidric al lacurilor glaciare este controlat în principiu de variațiile a două componente majore ale climei – nivelul precipitațiilor și temperatura. Așa cum arată Magny⁹⁷, indiferent de ponderea alimentației nivale în bilanțul hidric, elementul determinant pentru fluctuațiile nivelului unui lac este reprezentat de nivelul precipitațiilor pe ansamblul bazinului său hidrografic și în special de repartitia acestora de-a lungul anului. În acest sens, fazele transgresive reflectă perioade de bilanț hidric excedentar determinat de deteriorarea condițiilor estivale – scăderea temperaturii medii, scurtarea verii și mai ales creșterea nivelului precipitațiilor. Fazele regresive reflectă perioade de deficit în bilanțul hidric al lacurilor, efect al verilor lungi, calde și mai ales uscate.

Prin reunirea celor trei diagrame (fig.8.A–C) rezultă o diagramă generală reprezentativă pentru oscilațiile nivelului lacurilor din Europa de Nord–West (fig.8.D). Imaginea generală astfel obținută (fig.8.E) include:

- ♦ perioade de bilanț hidric deficitar al lacurilor, deci intervale cu incidență crescută a verilor uscate, calde și eventual mai lungi – 11650–11100, 10850–10250, 8850–8600, 8450–8250, 8100–7850, 7300–6450, 6000–5350, 5100–4850, 4600–4500, 4200–3350, 3000–2900, 2100–1800, 1550–1400 și 1000–700 cal.BP;
- ♦ perioade de bilanț hidric excedentar al lacurilor, reprezentând intervale cu frecvență mărită a verilor umede și reci (și scurte) – o perioadă ce începe cel mai târziu la 11800 și durează până în 11650 cal.BP, apoi 10250–9000, 8600–8450, 8250–8150, 7650–7350, 6450–6000, 5350–5100, 4850–4600, 4500–4200, 3350–3000, 2900–2150, 1700–1550, 1400–1000 și 650–0 cal.BP.

7. Discuție

Oscilațiile timberline, snowline și cele ale nivelului lacurilor furnizează informații climatice prin definirea unor intervale în timpul cărora au predominat anumite caracteristici ale climei. Prin reunirea celor trei diagrame (fig.5.I, 7.J și 8.E) se obține o aglomerare de intervale ce dau impresia pieselor unui puzzle greu de reconstituit (fig.9.A). De aceea, înainte de a aborda acest demers sunt necesare câteva precizări.

Înainte de toate, trebuie subliniat încă o dată că factorii ce controlează procesele a căror dinamică a fost prezentată în paragraful 6., permit numai reconstituirea condițiilor climatice estivale și nu oferă informații asupra altor componente ale climei.

Toate curbele și diagramele reconstituirilor paleoclimatice holocene se sprijină în mare parte pe cronologia datărilor radiocarbon, ceea ce este valabil și pentru cele prezentate în această lucrare. Ori, așa cum arătam mai sus (6.2.), un fapt care trebuie avut permanent în vedere când se lucrează

⁹⁷ *Ibidem*.

cu astfel de grafice este acela că fiecare dată ^{14}C reprezintă de fapt un interval temporal în care vârsta radiocarbon reală a eșantionului datat are anumite șanse să se afle. Este evident că în aceste condiții precizia unei curbe trasate într-un cadru cronologic bazat pe date radiocarbon nu este optimă. Calibrarea datărilor (care s-a operat pentru toate diagramele din prezenta lucrare) nu îmbunătățește cu nimic această situație, datele calibrate reprezentând și ele tot intervale în care vârsta eșantioanelor se află cu o anumită probabilitate. Marele lor avantaj este însă acela că readuc cronologia din sistemul de referință abstract și nepractic al anilor radiocarbon (a căror durată este variabilă), într-unul practic și uzual – calendarul solar.

Figura 9. A - oscilațiile componentelor termică și hidrică ale climei estivale (ca și ale duratei anotimpului estival), așa cum rezultă din fig. 5.I, 7.J și 8.E (VSe - veri secetoase; VP - veri ploioase; VCL - veri calde și lungi; VRSc - veri reci și scurte; informația provine din oscilațiile timberline (T), snowline (S) și ale nivelului lacurilor (L)); B - succesiunea intervalelor pentru care informațiile climatice (din figura 9.A) nu sunt contradictorii (în alb veri calde, lungi, secetoase; în negru veri reci, scurte, ploioase); C - oscilațiile componentei termice a climei estivale și ale lungimii anotimpului estival, deduse din figura 9.A (în alb veri calde și lungi; în negru veri reci și scurte; hașurate - intervale pentru care informația climatică este nesigură); D - oscilațiile componentei hidrice a climei estivale, deduse din figura 9.A (în alb veri secetoase; în negru veri ploioase).

Precizia cronologică relativă a informațiilor utilizate va afecta așadar și rezultatele prezentate în cele ce urmează. Având în vedere că metoda de datare ^{14}C este până în prezent cea mai frecvent utilizată (pentru că permite datarea celui mai divers spectru de materiale), gradul de precizie al rezultatelor prezentate reprezintă maximum a ceea ce se poate obține din informația actuală; obținerea de rezultate mai precise din punct de vedere cronologic va fi posibilă atunci când astfel de reconstituiri paleoclimatice se vor baza în exclusivitate pe datări mai precise, de tipul celor furnizate de metoda dendrocronologică.

Ținând cont de ceea ce am mai sus, am considerat utilă și comodă, prin simplificările pe care le aduce, rotunjirea datelor ce reprezintă capetele intervalelor cu care se operează, la valori eșalonate din 50 în 50 de ani (solari). Astfel, precizia cronologică a informației obținute este de 50 de ani.

Un alt aspect important ce trebuie avut în vedere în interpretarea diagramelor din fig.5.I, 7.J și 8.E, privește semnificația lor climatică. Faptul că ele includ informații referitoare la două componente ale climei care sunt relativ independente – componenta termică și componenta hidrică –, contribuie parțial la aspectul de puzzle greu de reconstituit al acestor diagrame. Deși semnificația lor climatică a fost discutată pe larg în paragraful 6., o vom reaminti succint aici. În ceea ce privește *timberline*, perioadele de avansare (ridicare) sunt interpretate ca perioade de incidență crescută a verilor mai calde și mai lungi, iar perioadele de retragere (coborâre) a *timberline* ca intervale cu frecvență crescută a verilor reci și scurte. În cazul *snowline*, retragerea (ridicarea) ei este efectul unui interval de timp cu frecvență crescută a verilor mai calde și mai uscate decât media, și eventual mai lungi. Invers, avansarea (coborârea) *snowline* este efectul unui interval de deteriorare a condițiilor climatice estivale – frecvență mare a verilor cu temperaturi medii scăzute, nivel ridicat al precipitațiilor și mai scurte. Pentru *nivelul lacurilor* fazele transgresive reflectă perioade de bilanț hidric excedentar determinat de deteriorarea condițiilor estivale – scăderea temperaturii medii, scurtarea verii și mai ales creșterea nivelului precipitațiilor –, iar fazele regresive reflectă perioade de deficit în bilanțul hidric al lacurilor, efect al verilor lungi, calde și mai ales uscate.

Așadar oscilațiile *timberline* reflectă în principal variațiile componentei termice a climei – temperatura medie estivală –, în timp ce oscilațiile nivelului lacurilor le reflectă în principal pe cele ale componentei hidrice – nivelul precipitațiilor estivale. Cât despre oscilațiile *snowline*, acestea reflectă, în ponderi greu de stabilit, oscilațiile ambelor componente.

Gradul de încredere al informației din cele trei diagrame este diferit, fapt ce va fi avut în vedere în interpretarea acestor rezultate. Dacă diagramele obținute pe baza oscilațiilor *timberline* (5.I) și *snowline* (7.J) se bazează pe cantități importante de informație provenite din multe regiuni, informațiile incluse în diagrama oscilațiilor nivelului lacurilor (8.E) au un grad de încredere ceva mai redus. Aceasta se datorește faptului că în afară de lacurile din Jura, care formează un eșantion important și coerent, ele se bazează în plus numai pe informațiile oferite de un lac din Alpi și de un altul din Sudul Suediei.

Gradul de încredere al rezultatelor depinde de numărul surselor pe care se bazează informațiile. Privind diagramele din fig.5.H, 7.G și 8.A–C se poate observa că gradul de încredere este mai scăzut pentru perioada de început a Holocenului, pentru care informațiile provin din mai puține surse. El crește odată cu scăderea vârstei, astfel încât pentru perioada de după 10000 cal.BP el este deja mult mai ridicat, iar pentru cea de după 6300 cal.BP el este maxim.

Mărimea suprafeței de pe care provin informațiile cuprinse în cele trei diagrame condiționează reprezentativitatea geografică a rezultatelor obținute. Având în vedere că interpretarea presupune o sintetizare a acestor informații, și că informațiile cu reprezentativitatea cea mai redusă sunt cele furnizate de oscilațiile nivelului lacurilor, ce pot fi considerate reprezentative pentru Nordul și Vestul Europei, rezultatele obținute sunt reprezentative în primul rând pentru acest areal.

Concluzii

Creșterile accentuate și relativ bruște înregistrate de ritmul de topire a calotelor glaciare (Ib), debitul apelor de topire (IB) și ritmul de ridicare a nivelului oceanului planetar (IB) se eșalonează, așa cum am arătat mai sus (6.1.), în perioada 12200-11100 cal.BP. Ele marchează sfârșitul Dryasului Recent și începutul Holocenului, a cărui limită inferioară se situează deci în acest interval. Pe baza oscilațiilor poziției *timberline* și *snowline* în Alpi, limita (marcată de reluarea avansării rapide a *timberline* în altitudine și de reluarea retragerii rapide a *snowline*, după retragerea și respectiv

avansarea datorate Dryasului Recent) poate fi încadrată în perioada 12400-11900 cal.BP. Aceasta mărește intervalul în care ar putea fi trasată limita inferioară a Holocenului la aproximativ 1300 de ani (12400-11100 cal.BP). Această imprecizie considerabilă se datorează vitezelor de reacție diferite ale mediilor ce înregistrează oscilațiile climatice.

Cele mai recente două foraje efectuate în calota glaciară groenlandeză plasează limita Holocen/Pleistocen la 9700 ± 250 , respectiv 9600 ± 70 cal.BC, valori obținute pe baza variației raportului izotopic $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ și a numărării laminelor anuale de gheață⁹⁸. Limitele intervalului astfel definit sunt circa 11900-11500 cal.BP.

Cu toate că limita inferioară a Holocenului nu poate fi trasată cu exactitate, din cele de mai sus reiese clar că durata acestei epoci a depășit 11000 de ani, apropiindu-se poate de 12000 de ani.

În ceea ce privește interpretarea climatică, într-o primă etapă a ei am reunit informațiile climatice din diagramele 5.I, 7.J și 8.E, obținând o diagramă compusă ce descrie pe de o parte oscilațiile componente termice a climei estivale (ca și ale duratei anotimpului estival) și pe de altă parte pe cele ale componente hidrice a climei estivale – fig.9.A. În această reprezentare ies în evidență intervalele cu caracteristici climatice nete, cu alte cuvinte cele pentru care informațiile climatice nu sunt contradictorii. Acestea sunt:

- ♦ perioade cu veri calde, secetoase și lungi – 12100–11800, 11650–11100, 10700–10500, 8850–8700, 8300–8250, 8150–7750, 7100–6550, 6000–5700, 5100–4850, 4600–4500, 2080–1800 și 1000–900 cal.BP;

- ♦ acestora li se adaugă câteva perioade pentru care lipsesc informațiile privitoare la pluviometrie – 11100–10950, 7750–7700 și 1800–1700 cal.BP;

- ♦ perioade cu veri reci, ploioase și scurte – 9750–9650, 7700–7500, 5350–5200, 3350–3000, 2900–2150, 1400–1150 și 700–300 cal.BP;

- ♦ acestora li se adaugă două perioade pentru care lipsesc informațiile referitoare la pluviometrie – 10900–10850 și 2150–2100 cal.BP.

Intervalele enumerate mai sus sunt reprezentate în diagrama din fig.9.B. Pentru că, așa cum arătam mai devreme, precizia cronologică a interpretărilor este de 50 de ani, au fost reprezentate numai intervalele cu durata mai mare de 50 de ani; dintre intervalele cu durata de 50 de ani sunt reprezentate numai cele adiacente intervalelor mai mari și de același tip.

Aceste intervale cu caracteristici climatice nete reprezintă perioadele pentru care informațiile climatice luate în discuție prezintă cel mai ridicat grad de încredere. De aceea este interesant de observat că majoritatea maximelor și minimele puse în evidență de către oscilațiile timberline (6.2.) se încadrează în aceste intervale (8 din 13 maxime și 3 din 4 minime). Această situație poate constitui un argument în sprijinul corectitudinii metodei utilizate pentru sintetizarea rezultatelor, dar și al coerenței rezultatelor. Pe de altă parte, faptul că nu toate maximele și minimele se încadrează în intervalele cu definire climatică netă arată că metoda nu este perfectă și că reconstituiri climatice prezentate sunt perfectibile.

Mergând mai departe cu interpretarea, am intersectat informațiile din diagrama 9.A., ținând cont de gradul de încredere și semnificația climatică a informației furnizate de cele trei tipuri de fenomene (oscilațiile timberline, snowline și ale nivelului lacurilor), discutate mai sus. În plus, am disociat cele două componente climatice – termică și hidrică –, așa cum o cere de altfel și situația lor reală.

⁹⁸ *Ibidem.*

În cazul laturii termice a climei estivale am considerat că cel mai înalt grad de încredere îl au informațiile oferite de oscilațiile timberline, cel mai scăzut grad de încredere îl au cele oferite de oscilațiile nivelului lacurilor, iar informațiile oferite de oscilațiile snowline se află într-o poziție intermediară din acest punct de vedere. Prin urmare, au fost luate în considerare trei tipuri de intervale:

(i) intervale pentru care informațiile oferite de oscilațiile timberline și snowline concordă, indicând tipul de climă;

(ii) intervale pentru care oscilațiile snowline nu dau informații; chiar dacă cele oferite de oscilațiile timberline și ale nivelului lacurilor sunt contradictorii, tipul de climă îl indică în acest caz informațiile date de oscilațiile timberline;

(iii) intervale (redate între paranteze sau hașurate) pentru care deși oscilațiile timberline și snowline dau informații contradictorii, primele sunt confirmate de informațiile oferite de oscilațiile nivelului lacurilor.

Bineînțeles, intervalele izolate care se încadrează într-unul din cele trei tipuri dar aveau durata de 50 de ani nu au fost luate în considerare, ținând cont de gradul de precizie cronologică a interpretărilor. Pe aceleași considerente, intervalele care nu satisfăceau nici una din aceste trei condiții au fost neglijate atunci când se aflau în interiorul unor intervale incluse într-una din categoriile de mai sus și nu depășeau 50 de ani. Astfel a fost obținută o succesiune (fig.9.C) ce cuprinde:

- ♦ perioade cu veri calde și lungi – 12100–10950, 10700–9900, 9750–9200, 8850–8600, 8450–7700, (7500–7350), 7100–6450, (6400–6300), 6050–5600, 5150–4400, 4200–4000, 2050–1700, 1550–1400, (1150–1000), 1000–800 și (300–0) cal.BP;

- ♦ perioade cu veri reci și scurte – 12400–12100, 10900–10700, 9750–9650, 9200–9000, 7700–7500, (7300–7100), 5600–5200, 4000–3900, (3900–3700), 3700–3400, 3300–2100, 1400–1150 și 800–300 cal.BP.

Pentru reconstituirea variațiilor componentei hidrice a climei estivale am considerat că informațiile furnizate pe de o parte de oscilațiile snowline și pe de altă parte de cele ale nivelului lacurilor au din acest punct de vedere grade de încredere și semnificații echivalente. Prin urmare au fost excluse intervalele pentru care informațiile provenite din cele două surse erau contradictorii. Au mai fost excluse, la fel ca în cazul precedent, intervalele cu durata de 50 de ani care fie că ofereau informații semnificative, dar erau izolate, fie că apăreau în interiorul unui interval pentru care exista informație semnificativă. Succesiunea astfel obținută (fig.9.D) include:

- ♦ perioade cu veri secetoase – 12150–11800, 11650–11100, 10850–10500, 9000–8700, 8150–7750, 7100–6550, 6000–5700, 5100–4850, 4600–4500, 3900–3700, 3000–2900, 2100–1800 și 1000–900 cal.BP;

- ♦ perioade cu veri ploioase – 10000–9650, 9450–9300, 8600–8450, 7700–7300, 6450–6000, 5350–5150, 4500–4200, 3350–3000, 2900–2150, 1700–1550, 1400–1000 și 700–300 cal.BP.

Este de remarcat că ultimul interval cu veri ploioase - 700-300 cal.BP - și ultimul interval cu veri reci și scurte – 800–300 cal.BP - corespund în linii mari (ținând cont și de gradul de precizie cronologică a acestei reconstituiri) perioadei denumite *Little Ice Age* (a cărei datare variază oricum de la un autor la altul), caracterizată printr-o răcire a climei. Acesta constituie un argument în plus că metoda utilizată pentru sintetizarea rezultatelor este în esență corectă:

Atât în cazul oscilațiilor componente termice, cât și în cazul celei hidrice se observă intervale pentru care nu există informație, situație ce apare, de fapt, și în ceea ce privește cele trei diagrame de bază (fig.5.I, 7.J, 8.E). Aceste intervale reprezintă perioade pentru care informațiile climatice sunt contradictorii. Situația se poate datora (i) impreciziilor cronologice sau (ii) decalajelor generate de vitezele de reacție diferite ale mediilor avute în vedere, în diverse regiuni, la oscilațiile climatei; ea poate avea însă și (iii) cauze pur climatice - se poate ca tendințele antagonice puse în evidență de oscilațiile timberline, snowline și ale nivelului lacurilor, să fi avut ponderi echivalente în clima respectivelor perioade.

O astfel de perioadă este intervalul 300–0 cal.BP, pentru care informațiile privitoare la pluviometria sezonului estival sunt contradictorii. Dacă această contradicție are o cauză climatică (în sensul arătat mai sus), atunci înseamnă că, de exemplu, în intervalele definite ca perioade cu veri secetoase, verile secetoase erau mult mai frecvente și/sau mult mai secetoase decât ceea ce cunoaștem despre clima ultimelor trei secole. Din păcate nu se poate trece mai departe, la latura cantitativă a interpretărilor - cât de frecvente sau cât de secetoase -, nici în acest caz și nici în cazul componente termice a climatei estivale. Desigur, unele aprecieri pot fi făcute, pe baza amplitudinii oscilațiilor timberline și snowline și ținând cont și de alte informații, cum ar fi cele referitoare la variația insolației sezoniere de-a lungul timpului. Având însă în vedere că acestea ar putea constitui subiectul unei lucrări cu un volum apropiat de al acestora, nu le vom aborda aici.

Cu toate impreciziile inerente stadiului actual al cunoștințelor, reconstituirile prezentate în lucrarea de față sunt deja suficiente pentru a pune serios sub semnul întrebării imaginea clasică ce s-a împănmântat cu privire la clima Holocenului. Dacă așa-zisul optimum climatic holocen apare destul de evident – ca tendință generală de evoluție a climatei –, în diversele reconstituiri avute în vedere, numeroasele oscilații cu frecvență mai mică puse în evidență, care fragmentează acest optimum și a căror amplitudine nu este deloc neglijabilă, dovedesc că această imagine simplistă nu mai este suficientă și că acuratețea metodelor de investigație actuale începe să permită obținerea unei imagini mult mai detaliate și mai complexe asupra evoluției climatei în Holocen.

THE HOLOCENE – CHRONOLOGIC AND CLIMATIC DATA

Abstract

The paper includes a review of several aspects of the stratigraphic classification and chronology of the Holocene, as well as some palaeoclimatic reconstructions.

From the geochronologic point of view, the Holocene is an epoch of the Quaternary period. Defined principally on climatic criteria, it represents the interglacial that followed after the last glacial. Several other terms have been used or are still in use for designating the Holocene, depending on the criteria used to define it and the localities where it was defined: Postglacial, Flandrian, Versilian, Grimaldian. The lower limit of the Holocene is also defined mainly on climatic criteria – as the end of the last glacial –, which renders it imprecise. Consequently, this limit has been arbitrarily placed at 10000 BP (approx. 11200 cal.BP).

A short review is given of the definition by A.Blytt and R.Sernander of the Holocene stratigraphic classification which bears their names. Originally defined by characters which ascribed them (though not entirely) to biozones, as well as to lithozones, climatic zones and chronostratigraphic or

geochronologic units, the subdivisions of the Blytt-Semander classification presently have only a chronostratigraphic meaning. Their use as chronostratigraphic units is nevertheless affected by imprecision because of the different chronologic values they are given by different authors.

Pollen zones and zonations are defined in the paper; their basic principles of definition, as well as their evolution, are reviewed. Intensely used for a long time in large-scale stratigraphic correlations in the Holocene, pollen zonations have in fact little value for this type of correlations, due to the diversity of continental environments, which generates a corresponding diversity of synchronous pollen assemblages. Very practical in the reconstruction of the local vegetation history, pollen zones are presently used only in local-scale correlations.

Some aspects of the Holocene climate history are assessed on the basis of the climatic signal borne by different processes – the variations of the sea-level and the oscillations of the timberline, snowline and glacial lake levels. The sea-level variations and the rhythm of the isostatic deglacial uplift of the Scandinavian Peninsula are concurrent, proving that the deglaciation has been a pulsatory process that started no later than 20800 cal.BP. The information yielded by the evolution of deglacial processes places the lower limit of the Holocene somewhere between 12200 and 11100 cal.BP. The position of the timberline (which represents the upper altitudinal limit of forests in montane regions and the northern latitudinal limit of forests in the Northern Hemisphere) is controlled by summer temperatures and the duration of the summer season – periods with high incidence of warm, long summers witness altitudinal advances of the timberline, whereas during periods characterized by a high frequency of cold, short summers, the timberline retreats. The snowline (term designating the lower altitudinal limit of montane glaciers) oscillations are controlled by summer temperatures and precipitations, but also by the duration of the summer season – snowline retreats are induced by periods with high incidence of warm, dry and long summers, whereas snowline advances occur during periods characterized by a high frequency of cold, humid and short summers. Glacial lake level oscillations are controlled by summer precipitations and temperatures – low glacial lake levels are frequent in periods with high incidence of dry, warm summers, whereas periods characterized by a high frequency of humid, cold summers witness frequent high glacial lake levels.

The correlation of reconstructions drawn in several regions for the Holocene oscillations of timberline, snowline and glacial lake levels leads to the definition of several time intervals on the basis of their summer climate. The method used for defining them, as well as the representativity and reliability of these informations, are analysed. Intervals with prevailing warm and long summers: 12100–10950, 10700–9900, 9750–9200, 8850–8600, 8450–7700, 7500–7350, 7100–6450, 6400–6300, 6050–5600, 5150–4400, 4200–4000, 2050–1700, 1550–1400, 1150–1000, 1000–800 and 300–0 cal.BP. Intervals with predominating cold and short summers: 12400–12100, 10900–10700, 9750–9650, 9200–9000, 7700–7500, 7300–7100, 5600–5200, 4000–3900, 3900–3700, 3700–3400, 3300–2100, 1400–1150 and 800–300 cal.BP. Dry summers were frequent in the 12150–11800, 11650–11100, 10850–10500, 9000–8700, 8150–7750, 7100–6550, 6000–5700, 5100–4850, 4600–4500, 3900–3700, 3000–2900, 2100–1800 și 1000–900 cal.BP intervals, whereas humid summers prevailed in the 10000–9650, 9450–9300, 8600–8450, 7700–7300, 6450–6000, 5350–5150, 4500–4200, 3350–3000, 2900–2150, 1700–1550, 1400–1000 și 700–300 cal.BP intervals.